

**嘉義科學園區供水北線工程-水管橋設計(含監造)
及管線基本設計委託技術服務**

**規劃設計階段
生態檢核報告**

**黑潮環境生態顧問有限公司
中華民國 114 年 3 月**

目 錄

一、計畫說明	1
1.1 計畫緣起	1
1.2 生態檢核概述	1
1.3 工程及生態檢核作業範圍	1
1.4 生態檢核執行方法與流程	2
二、環境概述與文獻蒐集	4
2.1 環境及棲地概述	4
2.2 生態文獻與資源蒐集盤點	4
2.3 生態情報圖套繪	6
三、現地生態資源調查與分析	7
3.1 生態調查規劃與方法	7
3.2 生態調查成果與分析	15
四、棲地評估及工程影響評估	24
4.1 棲地品質評估分析	24
4.2 生態衝擊及工程影響評估	26
五、生態檢核作業成果	27
5.1 生態保育策略與措施	27
5.2 生態關注區域圖及生態保全對象說明	29
5.3 民眾參與會議紀錄與說明	31
5.4 施工期間生態保育措施監測計畫	31
六、參考文獻	32
附錄一、補充調查物種名錄	35
附錄二、水域棲地評估表	45
附錄三、生態執行團隊及人員組成名單	52
附錄四、生態檢核表單	57
附錄五、現地影像記錄	64

圖目錄

圖一、本工程計畫路線.....	2
圖二、公共工程生態檢核作業流程圖.....	3
圖三、調查相關點位圖.....	15
圖四、受脅植物分布位置圖.....	17
圖五、保育類物種發現位置.....	20
圖六、棲地評估樣站位置.....	25
圖七、生態關注區域圖.....	30

表目錄

表一、套疊法定自然保護區結果.....	6
表二、套疊其他生態相關圖資結果.....	6
表三、陸域動物影像記錄.....	19
表四、棲地評估樣站影像記錄.....	25

一、計畫說明

1.1 計畫緣起

臺灣高科技產業於全球扮演舉足輕重之角色，為此行政院計畫發展西部廊道及設立嘉義科學園區，引進半導體先進製程，打造南臺灣科技廊帶，並帶動地方產業數位轉型及成為研發創新之樞紐，依據台灣自來水公司第五區管理處「南部科學園區嘉義園區用水計畫書」，預估未來嘉義科學園區長期需求水量約為 36,000CMD，因既有管線及設備無法滿足園區目標年用水需求，故台灣自來水公司南區工程處依據台灣自來水公司嘉義科學園區供水計畫，於民國 113 年推動辦理「嘉義科學園區供水北線工程」(後稱本工程)，將自新港地區延伸埋設 Ø1000mm 輸水專管至嘉義科學園區供水，計畫於 116 年底前施工完成，待本工程完工後配合供水南線管線聯合調配供水，支援嘉義科學園區用水所需，使嘉義科學園區有雙水源系統可穩定供水。

1.2 生態檢核概述

為減輕工程對生態環境造成之負面影響，秉生態保育、公民參與及資訊公開之原則，以積極創造優質之環境，將依據「公共工程生態檢核注意事項」，進行相關生態檢核作業。

1.3 工程及生態檢核作業範圍

本案分為送水管線工程及水管橋工程：(1)送水管線工程，起點由縣道 164 號往嘉義縣新港鄉嘉民路，其中於縣道 157 號需穿越排水箱涵、嘉南大圳大侖分線、農田圳路箱涵、月眉大排水溝及嘉南大圳蒜頭支線，行經橋樑，再於鄉道嘉 58 線穿越排水箱涵後，抵達工程終點嘉義縣太保市南部科學園區嘉義園區，總埋管長度約為 14.8km；(2)水管橋工程共 2 處，分別為跨越朴子溪之灣內大橋、跨越新埤大排之埤溝橋，範圍如圖一所示。輸水管線大致上沿既有道路佈設，主要規劃以明挖覆蓋工法佈設管線，遇管線複雜路口、既有構造物或橋樑時，再採取推進工法穿越為原則，以避免影響既有道路使用及通行。檢核範圍則為送水管線外推 10 公尺之區域。


1.4 生態檢核執行方法與流程

(一) 生態檢核辦理依據


依據公共工程委員會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」規定於工程計畫核定、規劃、設計及施工階段辦理生態檢核工作，並需由具生態背景人員負責辦理基本設計階段之生態檢核作業，完整作業流程如圖二所示。

(二) 本階段生態檢核工作內容

1. 蒐集既有生態資料及辦理現地調查、評估生態環境衝擊程度、生態衝擊減輕之保育對策研擬。
2. 依據現地生態調查及評析成果，提出生態保育措施，同時檢討工程方案之可行性。



圖一、本工程計畫路線



圖二、公共工程生態檢核作業流程圖

二、環境概述與文獻蒐集

2.1 環境及棲地概述

本工程計畫路線橫跨嘉義縣六腳鄉、新港鄉及太保市，主要土地利用類型為農耕地、人工建物，亦經過部分水域（朴子溪）及高灘地雜木林等。

2.2 生態文獻與資源蒐集盤點

本團隊蒐集「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響說明書」(2022)、「臺灣生物多樣性網絡(TBN)」等生態調查資料，並加以彙整，以確實掌握預定開發路線周邊環境以及水、陸域生物資源。以下針對計畫周邊各項生物資源說明如下：

(一) 維管束植物

過往於鄰近區域共調查到 91 科 242 屬 306 種，若以形態區分，有喬木 114 種、灌木 36 種、藤本 27 種、草本 129 種，若以屬性區分，則有特有種 7 種、原生種 103 種、歸化種 110 種、栽培種 86 種。

依據「2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄」(臺灣植物紅皮書編輯委員會，2017)，物種受脅類別可分為絕滅(Extinct, EX)、野外絕滅(Extinct in the Wild, EW)、區域絕滅(Regionally Extinct, RE)、極危(Critically Endangered, CR)、瀕危(Endangered, EN)、易危(Vulnerable, VU)、接近受脅(Near Threatened, NT)、暫無危機(Least Concern, LC)、資料缺乏(Data Deficient, DD)、不適用(Not Applicable, NA) 及未評估(Not Evaluated, NE)等。本工程鄰近區域記錄到受脅植物包含：3 種瀕危(EN)(大葉羅漢松、菲島福木及三星果藤)、6 種易危(VU)(臺灣肖楠、棋盤腳、水茄苳、象牙柿、臺灣糯米條及蒲葵)。

依據行政院環境保護署公告之「植物生態評估技術規範」(民國 91 年 3 月 28 日環署綜字第 0910020491 號公告)所附「臺灣地區稀特有植物名錄」，文獻記錄到環評等級 1 之稀特

有植物（蘭嶼肉桂）以及環評等級 3 之稀特有植物（臺灣肖楠）。

此外，特有種植物共 7 種，分別為臺灣五葉松、臺灣肖楠、水柳、蘭嶼肉桂、臺灣欒樹、臺灣赤楠及臺灣糯米條。

（二）陸域動物

哺乳類共記錄 6 科 11 種，其中特有種 5 種（赤腹松鼠、金黃鼠耳蝠、堀川氏棕蝠、白鼻心、臺灣野兔），未記錄到保育類。

鳥類共記錄 34 科 63 種，其中特有種 2 種（五色鳥、小彎嘴），特有亞種 12 種（白頭翁、紅嘴黑鶲、樹鵠、褐頭鷦鷯、黃頭扇尾鶯、大卷尾、黑枕藍鵲、棕三趾鶲、小雨燕、環頸雉、鳳頭蒼鷹及南亞夜鷹），屬於珍貴稀有之二級保育類者有 6 種（黃鸝、環頸雉、黑翅鳩、鳳頭蒼鷹、遊隼及紅隼），其他應予保育之三級保育類者有 2 種（燕鴟、紅尾伯勞）。

兩棲類記錄 5 科 7 種，分別為拉都希氏赤蛙、澤蛙、貢德氏赤蛙、斑腿樹蛙、黑眶蟾蜍、虎皮蛙及小雨蛙，未記錄到特有種或保育類。

爬蟲類記錄 6 科 7 種，分別為疣尾蝎虎、斯文豪氏攀蜥、麗紋石龍子、多線真稜蜥、雨傘節、紅耳龜及斑龜，其中特有種 1 種（斯文豪氏攀蜥），未記錄保育類。

蝴蝶類記錄 5 科 33 種，未記錄特有種或保育類。

（三）水域生物

魚類共記錄 7 科 8 種，分別為銀高體鮑巴、翼甲鯰雜交魚、食蚊魚、口孵非鯽雜交魚、彈塗魚、爪哇擬鰕虎、線鱧及銀紋笛鯛，未記錄特有種或保育類物種。

蝦蟹螺貝類共記錄 7 科 9 種，分別為臺灣泥蟹、日本沼蝦、臺灣沼蝦、闊指沼蝦、漢氏無齒螳臂蟹、石田螺、福壽螺、臺灣椎實螺及囊螺，其中特有種 1 種（臺灣泥蟹），未記錄保育類物種。

2.3 生態情報圖套繪

(一) 法定自然保護區圖資套疊

根據政府釋出之相關自然保護區圖資進行套疊，相關法源依據及主管單位如下表一所示，結果顯示本工程計畫路線周邊皆無涉及到法定自然保護區範圍。

表一、套疊法定自然保護區結果

保護區類別	法源	主管機關/權責機關	鄰近與否
國家公園	國家公園法	內政部/國家公園署	否
自然保留區	文化資產保存法	農業部林業及自然保育署	否
自然保護區	森林法	農業部林業及自然保育署	否
野生動物保護區	野生動物保育法	農業部林業及自然保育署	否
野生動物重要棲息環境	野生動物保育法	農業部林業及自然保育署	否
重要濕地	濕地保育法	內政部/國家公園署	否
保安林	森林法	農業部林業及自然保育署	否

(二) 其他生態相關圖資套疊

根據民間或政府釋出之研究成果或生物分布觀測資料等生態相關圖資進行套疊，相關圖資來源如下表二所示。套疊結果顯示，本工程計畫路線周邊皆無涉及其他生態相關棲地。

表二、套疊其他生態相關圖資結果

圖資名稱	圖資說明	圖資出版單位	鄰近與否
重要野鳥棲息地	保育野鳥、留意專區內若有國際認定之棲地，須盡量降低影響。	國際鳥盟與中華鳥會。2015。	否
國土生態綠網關注區域圖	透過科學調查和分析，盤點國土破碎生態系統及優先保育地區，並針對各分區擬訂復育對策、重要工作事項以及權益關係人參與策略。	農業部林業及自然保育署。2020。	否
國土生態綠網區域保育軸帶	考量棲地復育與串連優先性，設定 45 條區域保育軸帶，依主要棲地樣態，分為丘陵型、溪流型、平原型、海岸型及離島型等 5 種類別。	農業部林業及自然保育署。2023。	否
109 年石虎分布模擬圖	林業及自然保育署計畫「108-109 年石虎保育行動綱領研擬與密度估算研究案」成果報告書，依據出現點位之棲地特性模擬其潛在分布範圍。	農業部生物多樣性研究所。2020。	否
水鳥熱點	篩選 eBird 資料庫 2014 年至 2019 年冬季（11 月~2 月）具一定努力量之鳥類紀錄進行分析，呈現水鳥密度高之地區。	農業部生物多樣性研究所。2020。	否

三、現地生態資源調查與分析

3.1 生態調查規劃與方法

(一) 補充調查項目

本計畫物種補充調查以計畫路線及其外推 10 公尺為調查範圍，相關調查位置如圖三所示，並已於 114 年 2 月進行陸域生態：維管束植物、哺乳類、鳥類、兩棲類、爬蟲類、蝴蝶類；水域生態：魚類、蝦蟹螺貝類等生物資源調查，各生物類別調查方法說明如後。

(二) 調查方法

1. 維管束植物

(1) 採集及鑑定：蒐集調查區域近年來之相關文獻，再配合現場採集工作，調查時沿可行之路線進行採集及記錄工作，進行全區之植種調查，包含原生、歸化及栽植之種類。參照 Flora of Taiwan 第二版、圖鑑及標本館資料，逐一鑑定核對，以確定種類無誤。

(2) 名錄製作及植物種類統計：植物名稱及名錄製作主要參考「Flora of Taiwan」(Huang et al., 1993-2003)。將發現之植物種類一一列出，依據科屬種之學名字母順序排序，附上中名，並註明生態資源特性(劉棠瑞，1960；許建昌，1971，1975；徐國士，1980，1987；劉瓊蓮，1993)。

(3) 具特殊價值的植物：稀特有植物之認定係依據行政院環境保護署公告之「植物生態評估技術規範」(中華民國 91 年 3 月 28 日環署綜字第 0910020491 號公告) 所附「臺灣地區稀特有植物名錄」；受脅植物之認定係依據 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄（臺灣植物紅皮書編輯委員會，2017）；珍貴稀有植物之認定係依據「文化資產保存法」及行政院農業委員會(中華民國 108 年 4 月 23 日農林務字第 1081700421 號公告) 所認定之珍貴稀

有植物名錄。

2. 陸域動物

(1) 哺乳類

A. 穿越線調查法

a. 調查路徑：沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持 GPS 定位所經航跡，如圖三所示。

b. 記錄方法：尋覓哺乳類之活動痕跡，包括足跡、排遺、食痕、掘痕、窩穴、殘骸等跡相，據此判斷種類並估計其相對數量。於夜間則以強力探照燈搜尋夜行性動物之蹤跡，並輔以鳴叫聲進行記錄。

c. 調查時段：日間時段約上午7~9時，夜間調查時段主要為19~21時，並視物種活動狀況機動調整調查時段。

B. 陷阱調查法

於每季（次）調查各使用10個臺灣製松鼠籠陷阱、20個薛曼氏鼠籠（Sherman's trap）進行連續三個捕捉夜，陷阱佈設位置如圖三所示，一個點代表5個陷阱。而為避免動物死亡，甚至造成族群量減少，陷阱皆於早晨巡查、記錄完畢，並當場釋放動物，避免脫水、曝曬死亡等問題發生。

C. 名錄製作及物種屬性判別

所記錄之哺乳類依據 A. 祁偉廉所著「臺灣哺乳動物」(2008)、B. 行政院農業委員會特有生物研究保育中心及林務局公布之「2017臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄」(2017)、C. 行政院農業委員會於中華民國114年2月7日農林業字第1132401967號公告之「陸域保育類野生動物名錄」(2025)、

D.臺灣物種名錄 <https://taicol.tw/>，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

(2) 鳥類

A.調查方法

採用穿越線調查法，穿越線調查法係沿調查範圍內可及路徑行進。每次調查均進行3次重複，數量呈現取3次重複中最大數量。

B.調查時段

白天時段於日出後三小時內完成；夜間調查時段主要為19~21時，並視物種活動狀況機動調整調查時段。

C.調查路徑及行進速率

沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持GPS定位所經航跡。行進速率約為時速1.5~2.5公里，如圖三所示。

D.記錄方法

調查人員手持GPS定位，於穿越線上記錄半徑20公尺內目視及聽到的鳥種、數量等資料；主要以目視並使用10×25雙筒望遠鏡輔助觀察，並輔以鳥類之鳴唱聲進行種類辨識。有關數量之計算需注意該鳥類活動位置與行進方向，以避免對同一隻個體重複記錄。以鳴聲判斷資料時，若所有的鳴叫均來自相同方向且持續鳴叫，則記為同一隻鳥。夜間觀察時以大型探照燈輔以鳥類鳴聲進行觀察記錄。

E.名錄製作及物種屬性判別

所記錄之鳥種依據 A. 農業部生物多樣性研究所及林業署公布之「2024臺灣鳥類紅皮書名錄」

(2024)、B.中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會審定之「2023年臺灣鳥類名錄」(2023)、C.行政院農業委員會於中華民國114年2月7日農林業字第1132401967號公告之「陸域保育類野生動物名錄」(2025)，進行名錄製作以及判別其稀有程度、居留性質、特有種、水鳥別及保育等級等。

(3) 兩棲類

A.調查方法

採用目視遇測法(Visual Encounter Method)，並以徒手捕抓法作為輔助，每次調查共進行三次重複。

B.調查時段

日間時段約上午9~12時，夜間調查時段主要為19~21時，並視物種活動狀況機動調整調查時段。

C.調查路徑及行進速率

沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持GPS定位所經航跡。行進速率約為時速1.5~2.5公里，如圖三所示。

D.記錄方法

以目視遇測法為主，調查人員在一定時間內有系統走過一特定段落的棲息地，記下眼睛看到的兩棲類動物種類與數目，除此之外，並以徒手捕抓法作為輔助，調查人員在永久性或暫時性水域，直接檢視水中是否有蛙卵、蝌蚪，並翻找底質較濕之覆蓋物，看有無已變態之個體藏匿其下。若聽聞叫聲（如蛙類）亦記錄之。

E.名錄製作及物種屬性判別

所記錄之種類依據 A.呂光洋等所著「臺灣兩生爬行動物圖鑑(第二版)」(2002)、B.楊懿如所著「賞蛙圖鑑-臺灣蛙類野外觀察指南(第二版)」(2002)、C.向高世等所著「臺灣兩生爬行類圖鑑」(2009)、D.行政院農業委員會特有生物研究保育中心及林務局公布之「2017臺灣兩棲類紅皮書名錄」(2017)、E.行政院農業委員會於中華民國114年2月7日農林業字第1132401967號公告之「陸域保育類野生動物名錄」(2025)、F.臺灣物种名錄 <https://taicol.tw/>，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

(4) 爬蟲類

A.調查方法

採用目視遇測法(Visual Encounter Method)，並以徒手捕抓法作為輔助，每次調查共進行三次重複。

B.調查時段

日間時段約上午9~12時，夜間調查時段主要為19~21時，並視物種活動狀況機動調整調查時段。

C.調查路徑及行進速率

沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持GPS 定位所經航跡。行進速率約為時速1.5~2.5公里，如圖三所示。

D.記錄方法

許多爬蟲類都有日間至樹林邊緣或路旁較空曠處曬太陽，藉此調節體溫之習性，因此以目視遇測法為主，調查人員在一定時間內有系統走過一特定段落的棲息地，記下眼睛看到的爬蟲類動

物種類與數目，除此之外，並以徒手捕抓法作為輔助，調查人員在可能出現爬蟲類的微棲地內，以徒手翻找環境中的遮蔽物（石頭、木頭、樹皮、廢輪胎、廢傢俱等），記錄眼睛看到的爬蟲類動物。若聽聞叫聲（如部分守宮科蜥蜴）亦記錄之。

E.名錄製作及物種屬性判別

所記錄之種類依據 A.呂光洋等所著「臺灣兩生爬行動物圖鑑（第二版）」（2002）、B.向高世等所著「臺灣兩生爬行類圖鑑」（2009）、C.「2017臺灣陸域爬行類紅皮書名錄」（2017）、D.行政院農業委員會於中華民國114年2月7日農林業字第1132401967號公告之「陸域保育類野生動物名錄」（2025）、E.臺灣物種名錄 <https://taicol.tw/>，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

（5）蝴蝶類

A.調查方法

採用穿越線調查法，沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持 GPS 定位所經航跡，如圖三所示。

B.調查時段

於上午9~12時完成，並視物種活動狀況機動調整調查時段。

C.調查路徑及行進速率

沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持 GPS 定位所經航跡，路線如圖三所示。行進速率約為時速1.5~2.5公里。

D.記錄方法

主要以目視、捕蟲網捕捉並使用10×25雙筒望遠鏡輔助觀察，進行種類辨識。

E.名錄製作及物種屬性判別

所記錄之種類依據 A.張永仁所著之「蝴蝶100：臺灣常見100種蝴蝶野外觀察及生活史全紀錄（增訂新版）」(2007)、B.徐堉峰所著之「臺灣蝴蝶圖鑑（上）、（中）、（下）」(2013)、C.徐堉峰所著之「臺灣蝶類誌第一卷鳳蝶科、第二卷粉蝶科、第三卷弄蝶科、第四卷灰蝶科、第五卷蛺蝶科」(2018, 2019, 2020, 2021, 2022)、D.行政院農業委員會於中華民國114年2月7日農林業字第1132401967號公告之「陸域保育類野生動物名錄」(2025)、E.臺灣物種名錄 <https://taicol.tw/>，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

3. 水域生物

(1) 魚類

A.調查方法

可分為2種，A.手拋網採集法：適用於水量較小，底質為沙質且流速較緩的水域。各樣站以10網為努力量，手拋網規格為5分12呎。B.蝦籠誘捕：於籠內放置餌料以吸引魚類進入，於各樣站分別設置5個籠具，並放置3夜。蝦籠直徑為10公分，長度29公分。放置位置如圖三水域樣站所示。

B.名錄製作及物種屬性判別

所記錄之種類依據 A.行政院農業委員會特有生物研究保育中心及林務局公布之「2017臺灣淡水魚類紅皮書名錄」(2017)、B.行政院農業委員會於中華民國114年2月7日農林業字第

1132401967號公告之「陸域保育類野生動物名錄」
(2025)、C. 中央研究院之臺灣魚類資料庫
(<http://fishdb.sinica.edu.tw/>)、D. 臺灣物種名錄
<https://taicol.tw/>，進行名錄製作以及判別其稀有
程度、特有種及保育等級等。


(2) 蝦蟹螺貝類

A.調查方法

可分為2種，分別為徒手採集法以及蝦籠誘捕法，其方法及努力量分別敘述如下。A.徒手採集法：主要用於螺貝類採集，以1平方公尺為採集面積。B.蝦籠誘捕法：於籠內放置餌料以吸引蝦、蟹類進入，於各樣站分別設置5個籠具，並放置3夜。蝦籠直徑為10公分，長度29公分。放置位置如圖三水域樣站所示。

B.名錄製作及物種屬性判別

名錄製作及鑑定：所記錄之種類依據 A.臺灣物種名錄 <https://taicol.tw/>，B.中央研究院生物多樣性研究中心之臺灣貝類資料庫 (<http://shell.sinica.edu.tw/>) 進行名錄製作。



圖三、調查相關點位圖

3.2 生態調查成果與分析

(一) 維管束植物

本工程計畫路線橫跨嘉義縣六腳鄉、新港鄉及太保市，主要土地利用類型為農耕地、人工建物，亦經過部分水域（朴子溪）及高灘地雜木林等。

調查範圍內共記錄75科198屬245種，若以形態區分，有喬木83種、灌木32種、藤本22種、草本植物108種，以草本植物比較最高，佔44.1%；若以屬性區分，則有特有種4種、非特有原生種95種、歸化種72種、栽培種74種，以非特有原生種比較最高，佔39.4%，物種名錄詳見附錄一-1。

依據「文化資產保存法」（中華民國108年4月23日農林務字第1081700421號公告）認定之珍貴稀有植物名錄，調查區域未記錄到珍貴稀有植物。

依據行政院環境保護署公告之「植物生態評估技術規

範」(中華民國91年3月28日環署綜字第0910020491號公告)所附「臺灣地區稀特有植物名錄」，調查區域未記錄到稀特有植物。

依據「2017臺灣維管束植物紅皮書名錄」(臺灣植物紅皮書編輯委員會，2017)，物種受脅類別可分為絕滅(Extinct, EX)、野外絕滅(Extinct in the Wild, EW)、區域絕滅(Regionally Extinct, RE)、極危(Critically Endangered, CR)、瀕危(Endangered, EN)、易危(Vulnerable, VU)、接近受脅(Near Threatened, NT)、暫無危機(Least Concern, LC)、資料缺乏(Data Deficient, DD)、不適用(Not Applicable, NA)及未評估(Not Evaluated, NE)等。其中，極危(CR)、瀕危(EN)、易危(VU)三類屬於受脅等級，在調查區域中記錄到4種受脅植物，分別為1種極危(CR)(蘭嶼羅漢松)、2種瀕危(EN)(菲島福木、流蘇)及1種易危(VU)(蘚艾)，分布位置詳見圖四。其中蘭嶼羅漢松、菲島福木及蘚艾為民宅周邊之綠美化植物，流蘇則為行道樹，於嘉民路兩旁有大量栽植(圖中僅以一點作為代表)。

此外，記錄特有種4種(臺灣五葉松、水柳、臺灣欒樹、長枝竹)，皆屬於人為種植之綠美化植物。

調查範圍內未記錄到嘉義縣政府已列管或符合嘉義縣樹木保護自治條例之受保護樹木，然於灣內大橋右岸堤防內發現約4株大榕樹，構成巨大樹冠，由於榕樹枝幹眾多，難以精確測量，但預估應有達到嘉義縣樹木保護自治條例之受保護樹木標準，距離計畫路線約40公尺(TWD97 178671, 2599734)，雖位於本案調查範圍之外，但若水管橋設置過程中需開闢施工便道，則應注意避免對其造成干擾。



圖四、受脅植物分布位置圖

(二) 陸域動物

1. 組成及數量

哺乳類調查結果共記錄3科5種28隻次，生物名錄及調查隻次詳見附錄一-2，其中尖鼠科及鼠科於陷阱捕獲，赤腹松鼠為目視記錄。

鳥類調查結果共記錄21科37種1,431隻次，生物名錄及調查隻次詳見附錄一-3。本調查範圍內以農耕地、人工建物為主，故鳥類主要由陸生性鳥類組成，但因有朴子溪流經，亦記錄到水鳥包括：紅冠水雞、高蹺鴕、小環頸鴕、磯鶴、蒼鷺、大白鷺、小白鷺、夜鷺、翠鳥及白鶲鴒，共10種。所記錄之物種多屬平原及丘陵普遍常見物種。

兩棲類調查結果共記錄3科3種36隻次，生物名錄及調查隻次詳見附錄一-4，本調查範圍涵蓋溪流、水田

等水域環境，故記錄之兩棲類物種多發現於河道、溝渠及水塘，皆為平原及丘陵環境普遍常見物種。

爬蟲類調查結果共記錄4科5種57隻次，生物名錄及調查隻次詳見附錄一-5。主要出現於調查範圍內之路緣建物及水域周邊，所記錄到皆為平原及丘陵環境普遍常見物種。

蝴蝶調查共記錄4科8亞科23種226隻次，生物名錄及調查隻次詳見附錄一-6，主要出現於調查範圍內之農耕地周邊，所記錄到皆為平原及丘陵環境普遍常見物種。

陸域動物之相關影像記錄如表三所示。

表三、陸域動物影像記錄


	
生物照-野鴿 2025/2/7	生物照-紅鳩 2025/2/7
	
生物照-大卷尾 2025/2/7	生物照-黃頭鶲 2025/2/7
	
生物照-高蹺鶲 2025/2/7	生物照-麻雀 2025/2/7
	
生物照-白頭翁 2025/2/7	生物照-夜鷺 2025/2/7

2. 臺灣特有種及臺灣特有亞種

共記錄2種臺灣特有種(五色鳥、斯文豪氏攀蜥)，以及8種臺灣特有亞種(赤腹松鼠、南亞夜鷹、小雨燕、大卷尾、樹鵲、褐頭鷦鷯、白頭翁及紅嘴黑鵯)。

3. 保育類物種

監測記錄到1種珍貴稀有之第二級保育類物種(黑翅鳶)及1種其他應予保育之第三級保育類物種(紅尾伯勞)，發現位置如圖五所示。保育等級判定係依據行政院農業委員會於中華民國114年2月7日農林業字第1132401967號公告之「陸域保育類野生動物名錄」。



圖五、保育類物種發現位置

4. 物種受脅狀態

依據農業部生物多樣性研究所及林業署公布之「2024臺灣鳥類紅皮書名錄」(2024)、「2017臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄」(2017)、「2017臺灣兩棲類紅皮書名錄」(2017) 及「2017臺灣陸域爬行類紅皮書名錄」(2017)。可將物種受脅狀態區分為絕滅(Extinct, EX)、野外絕滅(Extinct in the Wild, EW)、區域絕滅(Rgional Extinct, RE)、極危(Critically Endangered, CR)、瀕危(Endangered, EN)、易危(Vulnerable, VU)、接近受脅(Near Threatened, NT)及暫無危機(Least Concern, LC)等，綜合上述資料，其中認定具有受脅類別的種類為極危(CR)、瀕危(EN)及易危(VU)。調查結果記錄到1種易危(VU)(棕背伯勞)。

5. 優勢種群

監測結果顯示，地棲型哺乳類以臭鼬較為優勢，約佔調查總隻次的39.3%，樹棲型哺乳類僅記錄到赤腹松鼠；鳥類之優勢族群依序為麻雀、紅鳩、白尾八哥，以上3種數量約佔調查總隻次的34.5%；兩棲類以黑眶蟾蜍較為優勢，約佔整體總隻次55.6%；爬蟲類以疣尾蜥虎數量較多，約佔整體總隻次47.4%。蝴蝶類以白粉蝶數量較多，約佔整體總隻次24.8%。

6. 鳥類之遷徙屬性

由於鳥類遷徙屬性與其生活的族群具有相關性，意即同一種鳥類可能兼具有留鳥或夏候鳥的族群，例如小白鷺可能有留鳥、夏候鳥、冬候鳥或過境鳥等不同遷徙屬性族群，故本報告依據中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會在2023年公佈的臺灣鳥類名錄，以該鳥種最普遍的族群進行以下遷徙屬性分析，監測記錄的37種鳥類中包含3種夏候鳥(小白鷺、黃頭鶲、家燕)，冬候鳥6種(小環頸鴨、磯鶴、蒼鶲、大白鷺、紅尾伯勞、

東方黃鸝鴿)，4種引進種（野鴿、喜鵲、家八哥、白尾八哥），其餘24種皆為留鳥，詳細完整遷徙屬性則可參見附錄一-3。

7. 鳥類生態同功群

鳥類覓食生態同功群採用林明志(1994)之定義，並參考池文傑(2000)、尤少彬(2005)、戴漢章(2009)等研究，係以鳥類覓食時的棲地利用為分類依據，可分為空域飛禽、伏衝捕魚鳥、海面捕魚鳥、泥灘涉禽、水岸性陸禽、樹林性陸禽、草原性陸禽、水域泥岸游涉禽及水域高草游涉禽等9種，而調查所記錄37種鳥類中，包括2種水岸性陸禽、4種水域泥岸游涉禽、1種水域高草游涉禽、3種泥灘涉禽、5種空域飛禽、16種草原性陸禽及6種樹林性陸禽，由調查紀錄可得知，本區調查範圍內之鳥類主要由草原性陸禽所組成。

(三) 水域生態

1. 樣站環境概況

(1) 樣站一(朴子溪上游)(TWD97 179342, 2601229)

兩側均為自然土坡，河道寬度約為30公尺，底質以圓石、卵石、細沉積沙土為主，水體顏色透明清澈，水深約50~100公分，河道兩旁植被有野蕡、銀合歡、蓖麻、紫花藿香薊、加拿大蓬等。

(2) 樣站二(朴子溪下游)(TWD97 178693, 2599311)

兩側均有水泥護岸，河道寬度約為50公尺，底質以圓石、卵石為主，水體顏色透明清澈，水深介於50~70公分，兩旁植被可見銀合歡、構樹、蓖麻、五節芒、象草、甜根子草等。

(3) 樣站三(新埤大排)(TWD97 178721, 2597935)

底質以圓石、細沉積砂土為主，水體顏色透明淺綠色，水深介於50~70公分，河道兩旁內可見巴拉草、

水丁香、風車草等植物。

2. 種屬組成及數量

魚類調查結果共記錄3科3種43隻次，未記錄特有種或保育類物種，各測站名錄及數量如附錄一-7所示，所記錄物種均屬分布於普遍常見魚種。

蝦蟹螺貝類調查結果共記錄2科3種57隻次，未記錄特有種或保育類物種，各測站名錄及數量如附錄一-8所示，所記錄物種均屬常見種類。


四、棲地評估及工程影響評估

4.1 棲地品質評估分析

為了評估施工階段之棲地品質，分析棲地品質趨勢變化，藉以釐清工程的施作是否對周遭環境產生影響，將根據不同棲地類型填列對應之棲地評估指標，以綜合評估棲地環境，並以量化方式評估工程前後現況，依據不同時期評估所得之數值，可以用以代表環境變化狀態。

水域棲地評估依照棲地類型不同，分為兩個部分：朴子溪水域環境屬自然河川，填列「河溪棲地評估指標」，設置河溪樣站(TWD97 179341, 2601217)，分數為 84 分；而新埤大排則因有較明顯之人為整治(排水設施)，故填列「區域排水生態指標及評估檢核方法之研究」之「區域排水生態速簡評估檢核表」，設置區域排水樣站(TWD97 179044, 2598106)，分數為 27 分；各樣站依據相對應之指標評分，所得評估結果及各細項得分如附錄二所示，樣站位置如圖六所示，樣站環境如表四所示。

表四、棲地評估樣站影像記錄



圖六、棲地評估樣站位置

4.2 生態衝擊及工程影響評估

本工程主要土地利用類型包含農耕地、人工建物，亦經過部分水域（朴子溪）及高灘地雜木林等，輸水管線大致上沿既有道路佈設，原則上，主要以明挖覆蓋工法佈設管線，遇管線複雜路口、既有構造物或橋樑時，再採取推進工法穿越，並包含水管橋工程共2處，分別為跨越朴子溪之灣內大橋、跨越新埤大排之埤溝橋。

整體對於植物影響程度較小，受影響者以行道樹或人為種植之景觀植物為主，較不具生態上之敏感性，惟須注意施工造成之揚塵、覆蓋植物表面、外來植物進駐等問題。

陸域動物方面，由於棲地環境多以人工建物、道路、農耕地為主，所調查到之動物多以高度適應人為干擾之生物為主，若未來計畫區施工，野生動物可能面臨人為騷擾、施工噪音振動造成忌避效應、局部棲地環境改變、流浪動物聚集騷擾、路殺等潛在影響。

水域生態方面，未來工程進行時，施工便道的開設、施工行為及機具所產生污染(如廢棄物、油脂、廢水等)，如無做好防護措施，可能直接對水域環境造成影響。此外，水管橋落墩處應避免擾動計畫區域外的水體。

五、生態檢核作業成果

5.1 生態保育策略與措施

綜合各類群生物所面臨之潛在影響，以及可能造成之衝擊，可以推論出物種的存續需建立在良好的棲地品質之下，故應盡可能保全棲地之完整性，以下依循迴避、縮小、減輕與補償之優先順序，擬定減輕生態衝擊之生態保育措施：

(一) 回避

1. 本工程計畫路線主要為農耕地及人工建物等低自然度之棲地類型，經生態相關圖層套繪後亦未涉及任何生態敏感區域，顯示計畫路線已迴避重要棲地。

(二) 縮小

1. 施工便道以既有道路為主，避免額外開闢其他自然棲地。
2. 施工所使用的物料或材料集中堆置區，以現有裸地或空地為主，不於自然棲地另闢堆置區，降低對環境及生物之衝擊。

(三) 減輕

1. 施工區域及施工機具行經路線加強路面灑水維護及泥沙清理，以減少揚塵產生。
2. 明挖段施工造成之地面裸露處或土砂堆置區應覆蓋防塵網或草蓆，避免揚塵及外來植物伺機進駐。
3. 明挖段應設立圍籬以防止動物誤闖入施工範圍而受傷，並可降低工程機具噪音的干擾，此外，圍籬應確實埋入地下 10 公分，避免於地表活動的生物透過地下掘穴的方式越過圍籬進入施工範圍。
4. 施工區域應設置速限號誌(30 公里/小時以下)，未來車輛進出頻繁，車輛限速可以增加野生動物避車的反應時間，減少路殺。
5. 施工整地中嚴禁使用除草劑、毒餌或殺蟲劑等化學藥劑，避免毒殺野生動物。

6. 工程施作時間避免規劃於夜間，必要之夜間照明須設置遮光罩，藉以減低工程作業對周邊夜行性生物之干擾。
7. 嚴格監督工地人員，避免有違反「野生動物保育法」之行為發生，並嚴格管制施工人員不得騷擾、虐待及獵捕。
8. 整地或挖運過程中，施工機具可能產生大量噪音振動，可使用低噪音工法或低噪音機具施工，施工機具應定期維護保養，容易產生噪音的部位(如引擎)可加裝隔音裝置，施工周圍亦可搭建隔音牆或隔音布，以降低噪音振動對周邊野生動物的干擾。
9. 施工分區分段進行，若施工期間仍發現育離之野生動物，應局部暫停施工，並通報各縣市政府保育單位（1999）協助處理。
10. 由於近年流浪動物有增長趨勢，威脅各地野生動物生存。施工單位應妥善管理工區垃圾及廚餘回收，回收容器加蓋且嚴格禁止工地人員餵養流浪動物，遇流浪貓犬應撥打 05-3620025#28 或 1999 聯繫嘉義縣家畜疾病防治所處理。
11. 若有涉及到既有路面之外的挖掘，將建議土方就地鋪平，以維持潛在之種子庫。
12. 河川行水區內之施工(例如落墩工程)，應使用既有之高灘地作為施工便道，避免擾動或阻斷水流。

（四）補償

施工後期應有協助棲地回復，植種選擇以適地適木之原生種為原則，不得引進任何外來物種作為植栽。

建議植栽如下，喬木層於市區可種植：臺灣欒樹、茄苳、苦楝、大葉山欖、黃連木、竹柏、鐵色、相思樹、棋盤腳、白樹仔、欖仁舅、山菜豆、六翅木、山欖、厚皮香、恆春紅豆樹、小葉朴等；於郊區可栽植：毛柿、象牙樹、港口木荷、梧桐、恆春椎櫟、木荷、大頭茶、恆春山茶、大武石櫟、桂林栲、恆春楨楠、菲律賓楨楠、武威山烏皮茶、山欖、蘭嶼羅漢松等植物。


5.2 生態關注區域圖及生態保全對象說明

(一) 生態關注區域圖

為降低工程對周圍生態環境的衝擊擾動，將生態保育的觀念融入工程治理方案，評估工程擾動對生態環境的影響程度，並繪製生態關注區域圖，藉以降低工程擾動對自然環境造成之不可逆影響。為協助確認各工程區域的潛在影響範圍以及應特別關注的生態保全對象，以利工程單位掌握工區附近生態特性，因此將工程範圍周圍環境以生態敏感等級為指標，區分如下表所示。

敏感等級	原則	棲地類型	建議事項
高	屬不可取代或不可回復的資源，或生態功能與生物多樣性高的自然環境	如天然林、生態較豐富的棲地(如濕地)、保育類動物潛在活動範圍、稀有及瀕危植物棲地、天然河溪地形、岩盤等未受人為干擾或破壞的地區	在工程選址時必須避開、工程進行時也不能擾動破壞
中	過去或目前受到部分擾動、但仍具有生態價值的棲地	如竹林闊葉混合林或人為干擾程度相對較少的區域，可能為部分物種適生棲地或生物廊道；而次生林、裸露礫石河床、草生地等，可逐漸演替成為較佳的環境	須注意棲地的保護及復育
低	人為干擾程度大或原生環境已受人為變更	如大面積竹林、農墾地、房屋、道路、已有壩體的河段、護岸等人為設施	工程進行時需注意施工後的環境

調查範圍內主要為農耕地、人工建物（道路、聚落），皆屬於人為干擾嚴重之低度敏感區（綠色區塊）；計畫路線與朴子溪交會處有部分高灘地樹林，為調查範圍內相對較佳之棲地，屬於中度敏感區（黃色區塊），如圖七所示。



圖七、生態關注區域圖

(二) 生態保全對象

本工程計畫路線主要為農耕地及人工建物(道路、聚落)等低自然度之棲地類型，經生態相關圖層套繪後亦未涉及任何生態敏感區域，顯示計畫路線並無涉及生物之重要棲地，此外，調查區域內亦無符合嘉義縣政府公告之嘉義縣珍貴樹木等大樹，故本案無保全對象。

5.3 民眾參與會議紀錄與說明

於 114 年 4 月針對嘉義縣新港鄉及六腳鄉民眾進行訪談，受訪談者共 2 位，相關記錄詳見民眾參與紀錄表(附錄四)。

5.4 施工期間生態保育措施監測計畫

請施工廠商依據生態保育措施自主檢查表(附錄四)按月自主檢查、填寫，若遇異常狀況，如：生物大量死亡、生態保全對象遭破壞等情況，應立即停工，由現場人員拍照記錄，並填寫環境生態異常狀況處理表。此外，生態團隊亦需按工期定期進行生態保育措施抽查。

六、參考文獻

(一) 生物調查技術及鑑定類-陸域植物

- 王慷林。2004。觀賞竹類。中國建築工業出版社。
- 呂勝由、施炳霖、陳志雄。1998。台灣稀有及瀕危植物之分級彩色圖鑑（III）。
行政院農委會印行。
- 呂勝由、施炳霖、陳志雄。1998。台灣稀有及瀕危植物之分級彩色圖鑑（IV）。
行政院農委會印行。
- 呂勝由、郭城孟等編。1996。台灣稀有及瀕危植物之分級彩色圖鑑（I）。行政
院農委會印行。
- 呂勝由、郭城孟等編。1997。台灣稀有及瀕危植物之分級彩色圖鑑（II）。行政
院農委會印行。
- 呂福原、歐辰雄、呂金誠，1999。台灣樹木解說（一）（二）（三）。行政院農業
委員會。
- 李松柏。2007。台灣水生植物圖鑑。晨星出版社。
- 徐國士。1980。台灣稀有及有絕滅危機之植物。台灣省政府教育廳。
- 徐國士。1988。臺灣野生草本植物。臺灣省政府教育廳。
- 徐國士等。1987。台灣稀有植物群落生態調查。行政院農業委員會。
- 張永仁。2002。野花圖鑑。遠流出版社。
- 張碧員等。2000。台灣野花365天。大樹出版社。
- 許建昌。1971。臺灣常見植物圖鑑，I-庭園路旁耕地的花草。臺灣省教育會。
- 許建昌。1975。臺灣常見植物圖鑑，VII-臺灣的禾草。臺灣省教育會。
- 郭城孟。1997。台灣維管束植物簡誌（第1卷）。行政院農業委員會。
- 郭城孟。2001。蕨類圖鑑。遠流台灣館。
- 陳玉峰。2007。台灣植被誌 第九卷，物種生態誌。前衛出版社。
- 陳玉峰。2007。台灣植被誌 第六卷，闊葉林(二)(上、下)。前衛出版社。
- 陳俊雄、高瑞卿。2008。台灣行道樹圖鑑。貓頭鷹
- 楊遠波、劉和義、呂勝由。1999。台灣維管束植物簡誌（第2卷）。行政院農業委
員會。
- 楊遠波、劉和義、林讚標。2001。台灣維管束植物簡誌（第5卷）。行政院農業委
員會。
- 楊遠波、劉和義、彭鏡毅、施炳霖、呂勝由。2000。台灣維管束植物簡誌（第4
卷）。行政院農業委員會。
- 楊遠波、劉和義。2002。台灣維管束植物簡誌（第6卷）。行政院農業委員會。
- 劉和義、楊遠波、呂勝由、施炳霖。2000。台灣維管束植物簡誌（第3卷）。行政
院農業委員會。
- 劉棠瑞。1960。臺灣木本植物圖誌。國立臺灣大學農學院。
- 劉瓊蓮。1993。臺灣稀有植物圖鑑（I）。臺灣省林務局。
- 羅宗仁、鍾詩文。2007。台灣種樹大圖鑑(上)(下)。天下文化。
- Heinrich W.1985. Vegetation of the Earth, and Ecological Systems of the Geobiosphere.
Springer-Verlag.
- Huang, T. C. et al. (eds). 1993-2003. Flora of Taiwan, Vol. 1-6.

(二) 生物調查技術及鑑定類-陸域動物

丁宗蘇、吳森雄、吳建龍、阮錦松、林瑞興、楊玉祥、蔡乙榮。2023。2023年臺灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。臺北，臺灣。

尤少彬。2005。由涉水鳥同功群探討沿海濕地的生態建設。水域與生態工程研討會。

向高世、李鵬祥、楊懿如。2009。台灣兩棲爬行類圖鑑。貓頭鷹出版社。

池文傑。2000。客雅溪口鳥類群聚的時空變異。國立台灣大學動物學研究所碩士論文。

呂光洋、杜銘章、向高世。2002。台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)。中華民國自然保育協會。

林明志。1994。關渡地區鳥類群聚動態與景觀變遷之關係。輔仁大學生物學研究所碩士論文。

祁偉廉。2008。臺灣哺乳動物(最新修訂版)。天下文化出版社。

徐堉峰。2018。臺灣蝶類誌第一卷鳳蝶科。農委會林務局。

徐堉峰。2019。臺灣蝶類誌第二卷粉蝶科。農委會林務局。

徐堉峰。2020。臺灣蝶類誌第三卷弄蝶科。農委會林務局。

徐堉峰。2021。臺灣蝶類誌第四卷灰蝶科。農委會林務局。

徐堉峰。2022。臺灣蝶類誌第五卷蛺蝶科。農委會林務局。

徐堉峰。2013。臺灣蝴蝶圖鑑(上)、(中)、(下)。晨星出版社。

張永仁。2007。蝴蝶100：台灣常見100種蝴蝶野外觀察及生活史全紀錄（增訂新版）。遠流出版社。

楊懿如。2002。賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)。中華民國自然與生態攝影學會。

鄭錫奇、方引平、周政翰。2015。臺灣蝙蝠圖鑑(第二版)。行政院農業委員會特有生物研究保育中心。

戴漢章。2009。關渡自然公園棲地經營管理對鳥類相影響。國立台灣大學生態學與演化生物學研究所碩士論文。

濱野榮次。1987。台灣蝶類大圖鑑。牛頓出版社。

(三) 生物調查技術及生物鑑定類-水域生物

中央研究院之台灣魚類資料庫 <http://fishdb.sinica.edu.tw/>

王漢泉。1999。淡水河系魚類生物監測分析。行政院環境保護署環境檢測所。

汪良仲。2000。台灣的蜻蛉。人人出版社。

沈世傑。1993。臺灣魚類誌。國立臺灣大學動物學系。

林春吉。2007。台灣淡水魚蝦（上、下）。天下文化出版社。

林曜松、梁世雄。1996。台灣野生動物資源調查之淡水魚資源調查手冊。行政院農業委員會。

邵廣昭、陳靜怡。2005。魚類圖鑑-台灣七百多種常見魚類圖鑑。遠流出版社。

邵廣昭、彭鏡毅、吳文哲主編。2008。2008台灣物種多樣性 II .物種名錄。行政院農業委員會林務局。

施志昀、李伯雯。2009。台灣淡水蟹圖鑑。晨星出版社。

施志昀等。1998。台灣的淡水蝦。國立海洋生物博物館籌備處。

施志昀等。1999。台灣的淡水蟹。國立海洋生物博物館籌備處。

梁象秋、方紀祖、楊和荃(編)。1998。水生生物學。水產出版社。

曾晴賢。1990。台灣淡水魚(I)。行政院農業委員會。
鄭先祐。1993。生態環境影響評估學。財團法人徐氏基金會。
賴景陽。1988。貝類(台灣自然觀察圖鑑)。渡假出版社有限公司。

(四) 法規及其他類

中央研究院之台灣魚類資料庫<http://fishdb.sinica.edu.tw/> (2025)
中央研究院生物多樣性研究中心之台灣貝類資料庫<http://shell.sinica.edu.tw/> (2025)
行政院農業部。2025。陸域保育類野生動物名錄。農林業字第1132401967號公告。
行政院環境保護署。2002。植物生態評估技術規範。2002/3/28環署綜字第0910020491號公告。
行政院環境保護署。2007。海洋生態評估技術規範。2007/8/2環署綜字第0960058664A號公告。
行政院環境保護署。2011。動物生態評估技術規範。2011/7/12環署綜字第1000058655C號公告。
行政院環境保護署環境檢驗所。2004。海域魚類採樣通則(NIEA E102.20C)。環署檢字第0930012345號公告。
行政院環境保護署環境檢驗所。2004。軟底質海域底棲生物採樣通則(NIEA E103.20C)。環署檢字第0930089721A號公告。
行政院環境保護署環境檢驗所。2004。硬底質海域表棲生物採樣通則(NIEA E104.20C)。環署檢字第0930089721B號公告。
林春富、楊正雄、林瑞興。2017。2017臺灣兩棲類紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心。南投。
林瑞興、邱承慶、潘森識。2024。2024臺灣鳥類紅皮書名錄。農業部生物多樣性研究所。南投。
林裕仁。1998。森林減碳能力之推算方法。農政與農情第193期。台北。
陳元龍、林德恩、林瑞興、楊正雄。2017。2017臺灣陸域爬行類紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心，行政院農業委員會林務局。南投。
楊正雄、曾子榮、林瑞興、曾晴賢、廖德裕。2017。2017臺灣淡水魚類紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心。南投。
農業部農村發展及水土保持署。2024。山坡地農地水土保持及附屬設施補助項目。
臺灣植物紅皮書編輯委員會。2017。2017臺灣維管束植物紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、臺灣植物分類學會。南投。
臺灣生物多樣性入口網<http://taicol.tw/> (2024)
臺灣生物多樣性網絡<https://www.tbn.org.tw/> (2024)
鄭錫奇、張簡琳玟、林瑞興、楊正雄、張仕緯。2017。2017臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局。南投。

附錄一、補充調查物種名錄

1. 維管束植物

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	受脅等級
蕨類植物	鳳尾蕨科	<i>Pteris vittata</i> L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	LC
蕨類植物	金星蕨科	<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai	小毛蕨	草本	原生	LC
蕨類植物	金星蕨科	<i>Cyclosorus parasitica</i> (L.) Farw.	密毛小毛蕨	草本	原生	LC
裸子植物	柏科	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>kaizuka</i> Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	NE
裸子植物	柏科	<i>Thuja orientalis</i> L.	側柏	喬木	栽培	NE
裸子植物	松科	<i>Pinus morrisonicola</i> Hayata	臺灣五葉松	喬木	特有	LC
裸子植物	羅漢松科	<i>Podocarpus costalis</i> Presl	蘭嶼羅漢松	喬木	原生	CR
裸子植物	杉科	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	落羽松	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	爵床科	<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard	翠蘆利	草本	歸化	NA
雙子葉植物	番杏科	<i>Trianthemum portulacastrum</i> L.	假海馬齒	草本	原生	LC
雙子葉植物	莧科	<i>Alternanthera bettzickiana</i> (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	NA
雙子葉植物	莧科	<i>Amaranthus viridis</i> L.	野莧菜	草本	歸化	NA
雙子葉植物	莧科	<i>Amaranthus patulus</i> Betoloni	青莧	草本	歸化	NA
雙子葉植物	漆樹科	<i>Mangifera indica</i> L.	芒果	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	漆樹科	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	黃連木	喬木	原生	LC
雙子葉植物	夾竹桃科	<i>Allamanda cathartica</i> L.	軟枝黃蟬	蔓性灌木	栽培	NE
雙子葉植物	夾竹桃科	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	黑板樹	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	夾竹桃科	<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) ex Lam. Bailey	緬梔	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	夾竹桃科	<i>Vinca rosea</i> L.	日日春	灌木	栽培	NA
雙子葉植物	五加科	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Kanehira	鵝掌藤	灌木	原生	LC
雙子葉植物	菊科	<i>Artemisia indica</i> Willd.	艾	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	<i>Aster subulatus</i> Michaux var. <i>subulatus</i>	帝馬蘭	草本	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker	野茼蒿	草本	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino	蕲艾	草本	原生	VU
雙子葉植物	菊科	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	鱉腸	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	<i>Lactuca indica</i> L.	鵝仔草	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	<i>Mikania micrantha</i> Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	銀膠菊	草本	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	<i>Tridax procumbens</i> L.	長柄菊	草本	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	<i>Vernonia amygdalina</i> Delile	扁桃葉斑鳩菊	草本	栽培	NE
雙子葉植物	菊科	<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.	一枝香	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	<i>Wedelia triloba</i> L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	NA

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	受脅等級
雙子葉植物	菊科	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i>	黃鵲菜	草本	原生	LC
雙子葉植物	落葵科	<i>Basella alba</i> L.	落葵	草質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	紫葳科	<i>Bignonia chamberlaynii</i> Sims	蒜香藤	木質藤本	栽培	NE
雙子葉植物	紫葳科	<i>Jacaranda acutifolia</i> Humb. et Bonpl.	藍花楹	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	紫葳科	<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	炮仗花	木質藤本	栽培	NE
雙子葉植物	紫葳科	<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	火燄木	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	木棉科	<i>Bombax malabarica</i> DC.	木棉	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	木棉科	<i>Pachira macrocarpa</i> (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	紫草科	<i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam.	滿福木	灌木	原生	LC
雙子葉植物	紫草科	<i>Cordia dichotoma</i> G. Forst.	破布子	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	紫草科	<i>Tournefortia argentea</i> L. f.	白水木	喬木	原生	LC
雙子葉植物	十字花科	<i>Lepidium virginicum</i> L.	獨行菜	草本	歸化	NA
雙子葉植物	仙人掌科	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	NA
雙子葉植物	山柑科	<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	成功白花菜	草本	歸化	NA
雙子葉植物	番木瓜科	<i>Carica papaya</i> L.	木瓜	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	木麻黃科	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	木麻黃	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	木麻黃科	<i>Casuarina nana</i> Sieber ex Spreng.	千頭木麻黃	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	藜科	<i>Chenopodium serotinum</i> L.	小葉灰薺	草本	原生	LC
雙子葉植物	金絲桃科	<i>Garcinia subelliptica</i> Merr.	菲島福木	喬木	原生	EN
雙子葉植物	使君子科	<i>Quisqualis indica</i> L.	使君子	蔓性灌木	栽培	NE
雙子葉植物	使君子科	<i>Terminalia catappa</i> L.	欖仁	喬木	原生	LC
雙子葉植物	使君子科	<i>Terminalia mantalyi</i> H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	旋花科	<i>Evolvulus nummularius</i> (L.) L.	短梗土丁桂	匍匐草本	歸化	NA
雙子葉植物	旋花科	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	番薯	草質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	旋花科	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	旋花科	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	LC
雙子葉植物	旋花科	<i>Merremia gemella</i> (Burm. f.) Hall. f.	菜樂藤	草質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	旋花科	<i>Operculina turpethum</i> (L.) S. Manso	盒果藤	草質藤本	原生	LC
雙子葉植物	瓜科	<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	NE
雙子葉植物	瓜科	<i>Momordica charantia</i> L. var. <i>abbreviata</i> Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	NE
雙子葉植物	杜英科	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.	杜英	喬木	原生	LC
雙子葉植物	大戟科	<i>Codiaeum variegatum</i> Blume	變葉木	灌木	栽培	NE
雙子葉植物	大戟科	<i>Euphorbia hirta</i> L.	飛揚草	草本	歸化	NA
雙子葉植物	大戟科	<i>Euphorbia hypericifolia</i> L.	假紫斑大戟	草本	歸化	NA
雙子葉植物	大戟科	<i>Euphorbia makinoi</i> Hayata	小葉大戟	草本	原生	LC
雙子葉植物	大戟科	<i>Euphorbia prostrata</i> Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	LC
雙子葉植物	大戟科	<i>Euphorbia serpens</i> (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	NA
雙子葉植物	大戟科	<i>Euphorbia thymifolia</i> (L.) Millsp.	千根草	草本	原生	NA

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	受脅等級
雙子葉植物	大戟科	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	LC
雙子葉植物	大戟科	<i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Muell. -Arg.	扛香藤	木質藤本	原生	LC
雙子葉植物	大戟科	<i>Melanolepis multiglandulosa</i> (Reinw.) Reich. f. & Zoll.	蟲屎	喬木	原生	LC
雙子葉植物	大戟科	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	烏柏	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	唇形花科	<i>Salvia splendens</i> Ker-Grawl.	一串紅	草本	栽培	NE
雙子葉植物	樟科	<i>Cinnamomum burmanni</i> Bl.	陰香	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	樟科	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	LC
雙子葉植物	樟科	<i>Persea americana</i> Mill	酪梨	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	豆科	<i>Acacia confusa</i> Merr.	相思樹	喬木	原生	LC
雙子葉植物	豆科	<i>Aeschynomene americana</i> L.	敏感合萌	草本	歸化	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	LC
雙子葉植物	豆科	<i>Bauhinia purpurea</i> L.	洋紫荊	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Bauhinia variegata</i> L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Clitoria ternatea</i> L.	蝶豆	草質藤本	原生	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Delonix regia</i> (Boj.) Raf.	鳳凰木	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	蠅翼草	草本	原生	LC
雙子葉植物	豆科	<i>Erythrina variegata</i> L.	刺桐	喬木	原生	LC
雙子葉植物	豆科	<i>Indigofera spicata</i> Forsk.	穗花木藍	草本	原生	LC
雙子葉植物	豆科	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Macroptilium atropurpureum</i> (Sesse & Moc. ex DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urban	寬翼豆	草本	歸化	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Mimosa pudica</i> L.	含羞草	草本	歸化	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Pongamia pinnata</i> (L.) Pierre	水黃皮	喬木	原生	LC
雙子葉植物	豆科	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	印度紫檀	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	豆科	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	雨豆樹	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	豆科	<i>Senna fistula</i> L.	阿勃勒	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	豆科	<i>Senna siamea</i> (Lamarck) Irwin & Barneby	鐵刀木	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	豆科	<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	NA
雙子葉植物	母草科	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) Benth.	藍豬耳	草本	原生	LC
雙子葉植物	千屈菜科	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	紫薇	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	千屈菜科	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	千屈菜科	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	九芎	喬木	原生	LC
雙子葉植物	木蘭科	<i>Michelia alba</i> DC.	白玉蘭	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	錦葵科	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	朱槿	灌木	栽培	NE
雙子葉植物	錦葵科	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	黃槿	喬木	原生	LC
雙子葉植物	錦葵科	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garccke	賽葵	草本	歸化	NA
雙子葉植物	錦葵科	<i>Sida rhombifolia</i> L.	金午時花	小灌木	原生	LC
雙子葉植物	楝科	<i>Aglaia odorata</i> Lour.	樹蘭	喬木	栽培	NE

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	受脅等級
雙子葉植物	棟科	<i>Melia azedarach</i> Linn.	棟	喬木	原生	LC
雙子葉植物	棟科	<i>Swietenia macrophylla</i> King	大葉桃花心木	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	棟科	<i>Swietenia mahogoni</i> (L.) Jacq.	桃花心木	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	棟科	<i>Toona sinensis</i> (Juss.) M. Roem.	香椿	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	桑科	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	波羅蜜	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	桑科	<i>Artocarpus incisus</i> (Th.) L. F.	麵包樹	喬木	原生	LC
雙子葉植物	桑科	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹	喬木	原生	LC
雙子葉植物	桑科	<i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>microcarpa</i>	榕樹	喬木	原生	LC
雙子葉植物	桑科	<i>Ficus religiosa</i> L.	菩提樹	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	桑科	<i>Ficus septica</i> Burm. f.	大有榕	喬木	原生	LC
雙子葉植物	桑科	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	LC
雙子葉植物	桑科	<i>Morus australis</i> Poir.	小葉桑	灌木	原生	LC
雙子葉植物	紫金牛科	<i>Ardisia squamulosa</i> Presl	春不老	灌木	歸化	NA
雙子葉植物	桃金娘科	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	檸檬桉	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	桃金娘科	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk.	黃金串錢柳	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	桃金娘科	<i>Melaleuca leucadendra</i> L.	白千層	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	桃金娘科	<i>Psidium guajava</i> L.	番石榴	灌木	歸化	NA
雙子葉植物	桃金娘科	<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & Perry	蓮霧	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	紫茉莉科	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	九重葛	攀緣灌木	栽培	NE
雙子葉植物	木犀科	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxton	流蘇	喬木	原生	EN
雙子葉植物	木犀科	<i>Fraxinus formosana</i> Hayata	白雞油	喬木	原生	LC
雙子葉植物	木犀科	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait.	茉莉花	草質藤本	栽培	NE
雙子葉植物	柳葉菜科	<i>Ludwigia erecta</i> (L.) Hara	美洲水丁香	草本	歸化	NA
雙子葉植物	酢醬草科	<i>Oxalis corniculata</i> L.	酢醬草	草本	原生	LC
雙子葉植物	酢醬草科	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	NA
雙子葉植物	西番蓮科	<i>Passiflora foetida</i> L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	西番蓮科	<i>Passiflora suberosa</i> Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	葉下珠科	<i>Bischofia javanica</i> Blume	茄冬	喬木	原生	LC
雙子葉植物	葉下珠科	<i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	LC
雙子葉植物	葉下珠科	<i>Phyllanthus debilis</i> Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	歸化	NA
雙子葉植物	葉下珠科	<i>Phyllanthus hookeri</i> Muell.-Arg.	疣果葉下珠	草本	原生	LC
雙子葉植物	葉下珠科	<i>Phyllanthus myrtifolius</i> Moon	錫蘭葉下珠	灌木	栽培	NE
雙子葉植物	葉下珠科	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	五蕊油柑	草本	原生	NA
雙子葉植物	車前草科	<i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small	黃花過長沙舅	草本	歸化	NA
雙子葉植物	藍雪科	<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	藍雪花	草本	栽培	NE
雙子葉植物	蓼科	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	早苗蓼	草本	原生	LC
雙子葉植物	馬齒莧科	<i>Portulaca oleracea</i> L.	馬齒莧	草本	原生	LC
雙子葉植物	薔薇科	<i>Prunus persica</i> Stokes	桃	喬木	栽培	NE

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	受脅等級
雙子葉植物	茜草科	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	山黃梔	喬木	原生	LC
雙子葉植物	茜草科	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	LC
雙子葉植物	茜草科	<i>Ixora × williamsii</i> Hort. cv. 'Sunkist'	矮仙丹花	灌木	栽培	NE
雙子葉植物	茜草科	<i>Ixora duffii</i> cv. 'Super King'	大王仙丹	灌木	栽培	NE
雙子葉植物	茜草科	<i>Paederia foetida</i> L.	雞屎藤	草質藤本	原生	LC
雙子葉植物	茜草科	<i>Spermacoce assurgens</i> Ruiz & Pavon	光葉鴨舌癀舅	草本	原生	NA
雙子葉植物	茜草科	<i>Spermacoce latifolia</i> Aublet	闊葉鴨舌癀舅	草本	原生	NA
雙子葉植物	芸香科	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	LC
雙子葉植物	楊柳科	<i>Salix babylonica</i> L.	垂柳	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	楊柳科	<i>Salix warburgii</i> O. Seem.	水柳	喬木	特有	LC
雙子葉植物	無患子科	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	倒地鈴	草質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	無患子科	<i>Euphorbia longana</i> Lam.	龍眼樹	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	無患子科	<i>Koelreuteria henryi</i> Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	LC
雙子葉植物	無患子科	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	無患子	喬木	原生	LC
雙子葉植物	山欖科	<i>Palaquium formosanum</i> Hayata	大葉山欖	喬木	原生	LC
雙子葉植物	玄參科	<i>Leucophyllum frutescens</i>	紅花玉芙蓉	灌木	栽培	NE
雙子葉植物	玄參科	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	通泉草	草本	原生	LC
雙子葉植物	玄參科	<i>Russelia equisetiformis</i> Cham. et Schlecht.	炮竹紅	灌木	栽培	NE
雙子葉植物	茄科	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	番茄	草本	栽培	NE
雙子葉植物	茄科	<i>Solanum alatum</i> Moench.	光果龍葵	草本	原生	NA
雙子葉植物	茄科	<i>Solanum diphyllum</i> L.	瑪瑙珠	灌木	歸化	NA
雙子葉植物	茄科	<i>Solanum melongena</i> L.	茄子	灌木	栽培	NE
雙子葉植物	茄科	<i>Solanum tuberosum</i> L.	馬鈴薯	草本	歸化	NA
雙子葉植物	梧桐科	<i>Sterculia nobilis</i> R. Br.	蘋婆	喬木	栽培	NE
雙子葉植物	榆科	<i>Celtis sinensis</i> Personn	朴樹	喬木	原生	LC
雙子葉植物	榆科	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	LC
雙子葉植物	蕁麻科	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	NA
雙子葉植物	馬鞭草科	<i>Clerodendrum thomsonae</i> Balf. f.	龍吐珠	蔓性灌木	栽培	NE
雙子葉植物	馬鞭草科	<i>Clerodendrum quadriloculare</i> (Blanco) Merr.	煙火樹	灌木	栽培	NE
雙子葉植物	馬鞭草科	<i>Duranta repens</i> L.	金露花	灌木	栽培	NA
雙子葉植物	馬鞭草科	<i>Lantana camara</i> L.	馬纓丹	灌木	歸化	NA
雙子葉植物	葡萄科	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Traut. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	LC
雙子葉植物	葡萄科	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	LC
單子葉植物	龍舌蘭科	<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) Goepf.	朱蕉	草本	栽培	NE
單子葉植物	龍舌蘭科	<i>Furcraea foetida</i> 'Mediopicta'	黃紋萬年麻	灌木	栽培	NE
單子葉植物	龍舌蘭科	<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsley	酒瓶蘭	灌木	栽培	NE
單子葉植物	龍舌蘭科	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	虎尾蘭	草本	栽培	NE
單子葉植物	石蒜科	<i>Crinum asiaticum</i> L.	文珠蘭	草本	原生	LC

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	受脅等級
單子葉植物	天南星科	<i>Colocasia esculenta</i> Schott	芋	草本	歸化	NA
單子葉植物	天南星科	<i>Pistia stratiotes</i> L.	大萍	草本	原生	NA
單子葉植物	天南星科	<i>Syngonium podophyllum</i>	合果芋	草本	歸化	NA
單子葉植物	棕櫚科	<i>Areca catechu</i> L.	檳榔	喬木	栽培	NE
單子葉植物	棕櫚科	<i>Caryota mitis</i> Lour.	叢立孔雀椰子	喬木	栽培	NE
單子葉植物	棕櫚科	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> H. A. Wendl.	黃椰子	喬木	栽培	NE
單子葉植物	棕櫚科	<i>Cocos nucifera</i> L.	椰子	喬木	栽培	NE
單子葉植物	棕櫚科	<i>Hyophorbe lagenicaulis</i> (L. H. Bailey) H. E. Moore	酒瓶椰子	喬木	栽培	NE
單子葉植物	棕櫚科	<i>Hyophorbe verschaffeltii</i> Wendl.	棍棒椰子	喬木	栽培	NE
單子葉植物	棕櫚科	<i>Phoenix roebelenii</i> O' Brien.	羅比親王海棗	喬木	栽培	NE
單子葉植物	棕櫚科	<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehder	觀音棕竹	灌木	栽培	NE
單子葉植物	棕櫚科	<i>Roystonea regia</i> (H. B. & K.) O. F. Cook	大王椰子	喬木	栽培	NE
單子葉植物	鳳梨科	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	NE
單子葉植物	美人蕉科	<i>Canna indica</i> L.	美人蕉	草本	歸化	NA
單子葉植物	莎草科	<i>Cyperus alternifolius</i> L. subsp. <i>flabelliformis</i> (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	NA
單子葉植物	莎草科	<i>Cyperus iria</i> L.	碎米莎草	草本	原生	LC
單子葉植物	莎草科	<i>Cyperus papyrus</i> L.	紙莎草	草本	栽培	NA
單子葉植物	莎草科	<i>Cyperus rotundus</i> L.	香附子	草本	原生	LC
單子葉植物	鳶尾科	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	射干	草本	原生	LC
單子葉植物	百合科	<i>Aloe vera</i> (L.) Webb. var. <i>chinese</i> Haw.	蘆薈	草本	栽培	NE
單子葉植物	芭蕉科	<i>Musa sapientum</i> L.	香蕉	草本	栽培	NE
單子葉植物	禾本科	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.	地毯草	草本	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Bambusa dolichoclada</i> Hayata	長枝竹	喬木	特有	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro	綠竹	喬木	栽培	NE
單子葉植物	禾本科	<i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Brachiaria subquadripara</i> (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	蒺藜草	草本	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Chloris barbata</i> Sw.	孟仁草	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro	麻竹	喬木	栽培	NE
單子葉植物	禾本科	<i>Dichanthium annulatum</i> (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	升馬唐	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link	芒稷	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight & Arn. ex Nees	鯽魚草	草本	原生	LC

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	受脅等級
單子葉植物	禾本科	<i>Eremochloa ophiurooides</i> (Munro) Hack.	假儉草	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>major</i> (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Oryza sativa</i> L.	稻	草本	栽培	NE
單子葉植物	禾本科	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	大黍	草本	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Paspalum conjugatum</i> Bergius	兩耳草	草本	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Paspalum distichum</i> L.	雙穗雀稗	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Paspalum notatum</i> Fluegge	百喜草	草本	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	象草	灌木	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	開卡蘆	灌木	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Rhynchospora repens</i> (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Rottboellia exaltata</i> L.f.	羅氏草	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Saccharum sinensis</i> Roxb.	甘蔗	草本	栽培	NE
單子葉植物	禾本科	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	甜根子草	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	詹森草	草本	歸化	NA
單子葉植物	禾本科	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br. var. <i>major</i> (Buse) G. J. Baaijens	鼠尾粟	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	<i>Zea mays</i> L.	玉蜀黍	草本	栽培	NE
單子葉植物	薑科	<i>Curcuma zedoaria</i> (Berg.) Rosc.	薑黃	草本	歸化	NA
單子葉植物	薑科	<i>Hedychium coronarium</i> Koenig	野薑花	草本	歸化	NA

註：

1.本名錄係依據黃增泉等（1993-2003）所著之 Flora of Taiwan 製作。

2.紅皮書等級：依 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄（臺灣植物紅皮書編輯委員會，2017）認定，本季調查共可分為 CR：極危、EN：瀕危、VU：易危、LC：暫無危機、NA：不適用(臺灣非其主要分布地點)、NE：未評估

2. 哺乳類名錄

科	中名	學名	特有類別	紅皮書等級	114.2
尖鼠科	臭鼬	<i>Suncus murinus</i>		LC	11
松鼠科	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus thailandensis</i>	Es	LC	3
鼠科	鬼鼠	<i>Bandicota indica</i>		LC	5
鼠科	小黃腹鼠	<i>Rattus losea</i>		LC	3
鼠科	溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>		LC	6
物種數小計 (S)					5
數量小計 (N)					28

註：

1.本名錄、特有類別等係參考自臺灣物种名錄 <https://taicol.tw>、臺灣蝙蝠圖鑑（鄭錫奇等, 2010）、臺灣哺乳動物（祁偉廉, 2008）

特有類別 Es:特有亞種

2.紅皮書等級係參考自 2017 臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄（鄭錫奇等, 2017）。

LC：暫無危機

3. 鳥類名錄

科	中名	學名	遷徙屬性	特有類別	保育等級	覓食同功群	紅皮書等級	114.2
鳩鴿科	野鴿	<i>Columba livia</i>	引進種			草原性陸禽	NA	85
鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	留鳥			草原性陸禽	NLC	155
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	留鳥			樹林性陸禽	NLC	26
夜鷹科	南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>	留鳥	Es		草原性陸禽	NLC	11
雨燕科	小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	留鳥	Es		空域飛禽	NLC	28
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	留鳥			水域高草涉禽	NLC	6
長腳鶲科	高蹠鶲	<i>Himantopus himantopus</i>	留鳥			泥灘涉禽	NLC	15
鶲科	小環頭鶲	<i>Charadrius dubius</i>	冬候鳥			泥灘涉禽	NLC	8
鶲科	磯鶲	<i>Actitis hypoleucos</i>	冬候鳥			泥灘涉禽	NLC	6
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	冬候鳥			水域泥岸游涉禽	NLC	3
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	冬候鳥			水域泥岸游涉禽	NLC	2
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	夏候鳥			水域泥岸游涉禽	NLC	12
鷺科	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>	夏候鳥			草原性陸禽	NLC	39
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	留鳥			水域泥岸游涉禽	NLC	4
鷺科	黑冠麻鷺	<i>Gorsachius melanophrys</i>	留鳥			樹林性陸禽	NLC	7
鷹科	黑翅鳶	<i>Elanus caeruleus</i>	留鳥		II	草原性陸禽	NLC	3
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	留鳥			水岸性陸禽	NLC	5
鬚鶲科	五色鳥	<i>Psilopogon nuchalis</i>	留鳥	E		樹林性陸禽	NLC	28
卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	留鳥	Es		草原性陸禽	NLC	42
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	冬候鳥		III	草原性陸禽	NLC	7
伯勞科	棕背伯勞	<i>Lanius schach</i>	留鳥			草原性陸禽	NVU	9
鶲科	樹鶲	<i>Dendrocitta formosae</i>	留鳥	Es		樹林性陸禽	NLC	16
鶲科	喜鶲	<i>Pica serica</i>	引進種			草原性陸禽	NLC	10
扇尾鶲科	灰頭鵙鶲	<i>Prinia flaviventris</i>	留鳥			草原性陸禽	NLC	27
扇尾鶲科	褐頭鵙鶲	<i>Prinia inornata</i>	留鳥	Es		草原性陸禽	NLC	58
燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>	留鳥			空域飛禽	NLC	34
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	夏候鳥			空域飛禽	NLC	84
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	留鳥			空域飛禽	NNT	75
燕科	赤腰燕	<i>Cecropis striolata</i>	留鳥			空域飛禽	NLC	67
鶲科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	留鳥	Es		樹林性陸禽	NLC	77
鶲科	紅嘴黑鶲	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	留鳥	Es		樹林性陸禽	NLC	25
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	引進種			草原性陸禽	NA	65
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引進種			草原性陸禽	NA	112
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	留鳥			草原性陸禽	NLC	33
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	留鳥			草原性陸禽	NNT	226
鶲鶲科	東方黃鸝鶲	<i>Motacilla tschutschensis</i>	冬候鳥			草原性陸禽	NLC	6
鶲鶲科	白鶲鶲	<i>Motacilla alba</i>	留鳥			水岸性陸禽	NLC	15
物種數小計(S)							37	
數量小計(N)							1,431	

註：

1.本名錄、特有性、遷徙屬性等係參考自 2023 年臺灣鳥類名錄（中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2023）

特有類別 E:特有種 Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 114 年 2 月 7 日農林業字第 1132401967 號公告

II:珍貴稀有之第二級保育類、III:其他應予保育之第三級保育類

3.紅皮書等級係參考自 2024 臺灣鳥類紅皮書名錄（林瑞興等, 2024）

NVU：易危、NLC：暫無危機、NNT：接近受脅、NA：不適用（臺灣非其主要分布地點）

4.鳥類生態同功群主要係採用林明志（1994）之定義，並參考尤少彬（2005）、池文傑（2000）、戴漢章（2009）研究

4. 兩棲類名錄

科	中名	學名	紅皮書等級	114.2
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	LC	20
叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>	LC	5
狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>	LC	11
物種數小計 (S)				3
數量小計 (N)				36

註：

1. 兩棲類名錄、特有類別等係參考自臺灣物種名錄 <https://taicol.tw>、臺灣兩棲爬行動物圖鑑（第二版）（呂光洋等，2002）、臺灣兩棲爬行類圖鑑（向高世等，2009），賞蛙圖鑑-臺灣蛙類野外觀察指南（第二版）（楊懿如，2002）

2. 紅皮書等級係參考自 2017 臺灣兩棲類紅皮書名錄（林春富等，2017）

LC：暫無危機

5. 爬蟲類名錄

科	中名	學名	特有類別	紅皮書等級	114.2
壁虎科	疣尾壁虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>		LC	27
飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Japalura swinhonis</i>	E	LC	5
石龍子科	麗紋石龍子	<i>Plestiodon elegans</i>		LC	8
石龍子科	多線真稜蜥	<i>Eutropis multifasciata</i>		DD	11
地龜科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>		LC	6
物種數小計 (S)					5
數量小計 (N)					57

註：

1. 爬蟲類名錄、特有類別等係參考自臺灣物種名錄 <https://taicol.tw>、臺灣兩棲爬行動物圖鑑（第二版）（呂光洋等，2002）、臺灣兩棲爬行類圖鑑（向高世等，2009）

特有類別 E:特有種

2. 紅皮書等級係參考自 2017 臺灣陸域爬行類紅皮書名錄（陳元龍等，2017）

LC：暫無危機、DD：資料缺乏

6. 蝴蝶類名錄

科	亞科	中名	學名	114.2
粉蝶科	粉蝶亞科	白粉蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i>	56
粉蝶科	粉蝶亞科	纖粉蝶	<i>Leptosia nina niobe</i>	12
粉蝶科	黃粉蝶亞科	遷粉蝶	<i>Catopsilia pomona</i>	11
粉蝶科	黃粉蝶亞科	亮色黃蝶	<i>Eurema blanda arsakia</i>	21
弄蝶科	弄蝶亞科	黑星弄蝶	<i>Suastus gremius</i>	6
弄蝶科	弄蝶亞科	黃斑弄蝶	<i>Potanthus confucius angustatus</i>	3
弄蝶科	弄蝶亞科	禾弄蝶	<i>Borbo cinnara</i>	10
弄蝶科	弄蝶亞科	尖翅褐弄蝶	<i>Pelopidas agna</i>	2
灰蝶科	藍灰蝶亞科	雅波灰蝶	<i>Jamides bochus formosanus</i>	4
灰蝶科	藍灰蝶亞科	淡青雅波灰蝶	<i>Jamides alecto dromicus</i>	2
灰蝶科	藍灰蝶亞科	豆波灰蝶	<i>Lampides boeticus</i>	16
灰蝶科	藍灰蝶亞科	細灰蝶	<i>Leptotes plinius</i>	3
灰蝶科	藍灰蝶亞科	藍灰蝶	<i>Zizeeria maha okinawana</i>	26
灰蝶科	藍灰蝶亞科	迷你藍灰蝶	<i>Zizula hylax</i>	11
蛺蝶科	斑蝶亞科	淡紋青斑蝶	<i>Tirumala limniace limniace</i>	5
蛺蝶科	斑蝶亞科	旖斑蝶	<i>Ideopsis similis</i>	6
蛺蝶科	線蛺蝶亞科	豆環蛺蝶	<i>Neptis hylas luculenta</i>	14
蛺蝶科	蛺蝶亞科	眼蛺蝶	<i>Junonia almana</i>	2
蛺蝶科	蛺蝶亞科	黃鈞蛺蝶	<i>Polygona c-aureum lunulata</i>	3
蛺蝶科	蛺蝶亞科	散紋盛蛺蝶	<i>Symbrenthia lilaea formosanus</i>	2
蛺蝶科	蛺蝶亞科	散紋盛蛺蝶	<i>Symbrenthia lilaea lunica</i>	2
蛺蝶科	蛺蝶亞科	幻蛺蝶	<i>Hypolimnas bolina kezia</i>	5
蛺蝶科	眼蝶亞科	藍紋鋸眼蝶	<i>Elymnias hypermnestra hainana</i>	4
物種數小計(S)				23
數量小計(N)				226

註：

1.蝴蝶類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣物種名錄 <https://taicol.tw>、臺灣蝶類誌第一卷鳳蝶科、第二卷粉蝶科、第三卷弄蝶科、第四卷灰蝶科、第五卷蛺蝶科（徐堉峰，2018, 2019, 2020, 2021）、蝴蝶 100：臺灣常見 100 種蝴蝶野外觀察及生活史全紀錄（增訂新版）（張永仁，2007）、臺灣蝴蝶圖鑑（上）、（中）、（下）（徐堉峰，2013）

7.魚類名錄

科	中名	學名	特有類別	紅皮書等級	114.2		
					A	B	C
鯉科	鯽	<i>Carassius auratus auratus</i>		LC	5	6	
體科	線鱈	<i>Channa striata</i>	外	LC	2	2	1
麗魚科	口孵非鯽	<i>Orechromis spp.</i>	外	LC	12	10	5
		物種數小計(S)			3	3	2
		數量小計(N)			19	18	6

註：

1.魚類名錄及生息狀態參考自臺灣物種名錄 <http://taicol.tw/>、中央研究院臺灣魚類資料庫 <http://fishdb.sinica.edu.tw/>

特有類別 外：農委會林業試驗所建置的「臺灣外來入侵種資料庫」中所定義之外來種

2.紅皮書等級係參考自 2017 臺灣魚類紅皮書名錄（楊正雄等，2017）

LC：暫無危機

空格：未評估（臺灣非其主要分布地點）

3.A:樣站一(朴子溪上游), B:樣站二(朴子溪下游), C:樣站三(新埤大排)

8.蝦蟹螺貝類名錄

科	中文名	學名	114.2		
			A	B	C
蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	4	3	13
長臂蝦科	粗糙沼蝦	<i>Macrobrachium asperulum</i>	6	4	
長臂蝦科	日本沼蝦	<i>Macrobrachium nipponense</i>	12	9	6
		物種數小計(S)	3	3	2
		數量小計(N)	22	16	19

註：

1.名錄製作參考自臺灣物種名錄 <http://taicol.tw/>，以及國立台灣海洋大學大型甲殼類資料庫、賴景陽所著貝類（臺灣自然觀察圖鑑）（1988）

特有類別 E：特有種

2.A:樣站一(朴子溪上游), B:樣站二(朴子溪下游), C:樣站三(新埤大排)

附錄二、水域棲地評估表

• 河溪棲地評估表

位置:朴子溪(○:表示與第一次調查同分，+:表示與第一次調查比較所增加分數，-表示與第一次調查比較所減少分數)

評估因子	說明	114/2
1.底棲生物的棲地基質	理想基質佔河道面積介於20到40%。	7
2.河床底質包埋度	礫石、卵石及巨石75%以上的體積被沉積砂土包圍。	3
3.流速水深組合	僅2種流速/水深。	6
4.沉積物堆積	河道底部受沉積物堆積影響的面積介於30-50%。	4
5.河道水流狀態	小於25%的溪床面積露出水面。	11
6.人為河道變化	過去曾有溪流治理，但並無新近的工程影響。	13
7.湍瀨出現頻率	水流平或淺，無巨石等可激起湍瀨的天然物。	4
8.堤岸穩定度	5-30%的堤岸受溪水沖蝕。	左7，右7
9.河岸植生保護	左岸50%以下的堤岸具原生植被；右岸50%以下堤岸具原生植被。	左2，右2
10.河岸植生帶寬度	左岸河岸植生帶的寬度大於18公尺；右岸河岸植生帶的寬度大於18公尺。	左9，右9
總分		84
現地環境描述	底質以圓石、卵石為主，棲地型態為深流	
特殊物種	-	

• 區域排水生態速簡評估檢核表

區域排水生態速簡評估檢核表

① 基本資料	紀錄日期	114年2月7日	填表人	沈冠宇
	水系名稱	新埤大排	行政區	嘉義縣六腳鄉
	工程名稱	嘉義科學園區供水北線工程	工程階段	<input type="checkbox"/> 計畫提報階段 <input checked="" type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段 <input type="checkbox"/> 維護管理
	調查樣區	TWD97 179044, 2598106	位置座標 (TW97)	TWD97 179044, 2598106
	工程概述	水管橋工程		
② 現況圖	<input type="checkbox"/> 定點連續周界照片 <input type="checkbox"/> 工程設施照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水域棲地照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水岸及護坡照片 <input type="checkbox"/> 水棲生物照片 <input type="checkbox"/> 相關工程計畫索引圖 <input type="checkbox"/> 其他			
				

類別	③ 評估因子勾選	④ 評分
(A) 水域型態多樣性	<p>Q：您看到幾種水域型態？（可複選）</p> <p><input type="checkbox"/>淺流、<input type="checkbox"/>淺瀨、<input type="checkbox"/>深流、<input checked="" type="checkbox"/>深潭、<input type="checkbox"/>岸邊緩流、<input type="checkbox"/>其他</p> <p>評分標準：</p> <p><input type="checkbox"/>水域型態出現4種以上：10分</p> <p><input type="checkbox"/>水域型態出現3種：6分</p> <p><input type="checkbox"/>水域型態出現2種：3分</p> <p><input type="checkbox"/>水域型態出現1種：1分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>同上，且水道受人工建造物限制，水流無自然擺盪之機會：0分</p> <p>生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態</p>	0
(B) 水域廊道連續性	<p>Q：您看到水域廊道狀態（沿著水流方向的水流連續性）為何？</p> <p>評分標準：</p> <p><input type="checkbox"/>仍維持自然狀態：10分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀態：6分</p> <p><input type="checkbox"/>受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：3分</p> <p><input type="checkbox"/>廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難：1分</p> <p><input type="checkbox"/>同上，且橫向結構物造成水量減少（如伏流）：0分</p> <p>生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻</p>	6
水的特性 (C) 水質	<p>Q：您看到聞到的水是否異常？（異常的水質指標如下，可複選）</p> <p><input type="checkbox"/>濁度太高、<input type="checkbox"/>味道有異味、<input type="checkbox"/>優養情形（水表有浮藻類）</p>	6

		<p>評分標準：</p> <p><input type="checkbox"/>皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10分 <input checked="" type="checkbox"/>水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6分 <input type="checkbox"/>水質指標有任一項出現異常：3分 <input type="checkbox"/>水質指標有超過一項以上出現異常：1分 <input type="checkbox"/>水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0分</p> <p>生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存</p>	
水陸域過渡帶及底質特性	(D) 水陸域過渡帶	<p>Q：您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少？</p> <p>評分標準：</p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率小於25%： 5分 <input checked="" type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率介於25%-75%： 3分 <input type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率大於75%： 1分 <input type="checkbox"/>在目標河段內，完全裸露，沒有水流： 0分</p> <p>生態意義：檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過渡帶特性 註：裸露面積為總面積(目標河段)扣除水與植物的範圍</p> <p>Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成？</p> <p>A：造型(水泥)模板、無植栽，0分。</p> <p style="text-align: right;">(詳河岸型式與植物覆蓋狀況分數表)</p> <p>生態意義：檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動的困難</p>	3

水陸域過渡帶 及底質特性	(E) 溪濱廊道 連續性	<p>Q：您看到的溪濱廊道自然程度？（垂直水流方向）</p> <p>評分標準：</p> <p><input type="checkbox"/>仍維持自然狀態：10分</p> <p><input type="checkbox"/>具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於30%廊道連接性遭阻斷：6分</p> <p><input type="checkbox"/>具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：3分</p> <p><input type="checkbox"/>大於60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>同上，且為人工構造物表面很光滑：0分</p>	0
		生態意義： 檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻	
(F) 底質 多樣性		<p>Q：您看到的河段內河床底質為何？</p> <p><input type="checkbox"/>漂石、<input checked="" type="checkbox"/>圓石、<input checked="" type="checkbox"/>卵石、<input checked="" type="checkbox"/>礫石、<input checked="" type="checkbox"/>細沉積砂土</p>	1
		<p>評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積比例</p> <p><input type="checkbox"/>面積比例小於25%： 10分</p> <p><input type="checkbox"/>面積比例介於25%~50%： 6分</p> <p><input type="checkbox"/>面積比例介於50%~75%： 3分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>面積比例大於75%： 1分</p> <p><input type="checkbox"/>同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積>1/5水道底面積：0分</p>	
生態特性	(G) 水生動物豐多度(原生)	<p>生態意義：檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋與渠底不透水之面積比例</p> <p>註：底質分布與水利篩選有關，本項除單一樣站的評估外，建議搭配區排整體系統(上、下游)底質多樣性評估</p> <p>Q：您看到或聽到哪些種類的生物？（可複選）</p> <p><input type="checkbox"/>水棲昆蟲、<input checked="" type="checkbox"/>螺貝類、<input checked="" type="checkbox"/>蝦蟹類、<input checked="" type="checkbox"/>魚類、<input type="checkbox"/>兩棲類、<input type="checkbox"/>爬蟲類</p>	1

	or 外來)	<p>評分標準：</p> <p><input type="checkbox"/>生物種類出現三類以上，且皆為原生種：7分 <input type="checkbox"/>生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4分 <input checked="" type="checkbox"/>生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1分 <input type="checkbox"/>生物種類僅出現一類或都沒有出現：0分 指標生物 <input type="checkbox"/>臺灣石鮋 或 田蚌：上述分數再+3分</p> <p>生態意義：檢視現況河川區排生態系統狀況</p>	
生態特性	(H) 水域生產者	<p>Q：您看到的水是什麼顏色？</p> <p>評分標準：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>水呈現藍色且透明度高：10分 <input type="checkbox"/>水呈現黃色：6分 <input type="checkbox"/>水呈現綠色：3分 <input type="checkbox"/>水呈現其他色：1分 <input type="checkbox"/>水呈現其他色且透明度低：0分</p> <p>生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類</p>	10
綜合評價		<p>水的特性項總分 = A+B+C = <u>12</u> (總分30分)</p> <p>水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F = <u>4</u> (總分30分)</p> <p>生態特性項總分 = G+H = <u>11</u> (總分20分)</p>	總和 = <u>27</u> (總分 80 分)

• 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表

偏好排序	河 岸	植物覆蓋狀況	分數
1	乾砌石	喬木+草花	5
2		喬木+藤	5
3		喬木+草花+藤	5
4	蓆式蛇籠	喬木+草花	5
5		喬木+藤	5
6		喬木+草花+藤	5
7	格框填卵石	喬木+草花+藤	5
8		喬木+草花	5
9		喬木+藤	3
10	漿砌石	喬木+草花	3
11		喬木+草花+藤	3
12		喬木+藤	3
13	箱籠	喬木+草花+藤	3
14		喬木+藤	3
15		喬木+草花	3
16	蓆式蛇籠	草花+藤	3
17	乾砌石	草花+藤	1
18	格框填卵石	草花+藤	1
19	漿砌	草花+藤	1
20	造型(水泥)模板	喬木+草花+藤	1
21		喬木+藤	1
22	蓆式蛇籠	無植栽	1
23	乾砌石	無植栽	1
24	造型(水泥)模板	喬木+草花	1
25	漿砌石	無植栽	1
26	箱籠	草花+藤	1
27	造型(水泥)模板	草花+藤	0
28	格框填卵石	無植栽	0
29	箱籠	無植栽	0
30	造型(水泥)模板	無植栽	0

註：喬木高度需大於 5 公尺，藤類常見於垂直綠化使用


附錄三、生態執行團隊及人員組成名單

姓名	黃呈彰
職稱	黑潮環境生態顧問有限公司/經理
負責工作	水域生態調查及評估
學歷	國立屏東科技大學水產養殖系 學士
專長	水域生態調查、生態環境影響評估
生態檢核實務經歷	<p>1.白河水庫集水區環境現況調查與水質改善評估規劃設計計畫。</p> <p>2.鏡面水庫集水區環境現況調查與水質改善評估規劃設計計畫。</p> <p>3.白河水庫繞庫防淤工程設計之生態檢核計畫。</p> <p>4.嘉義縣大埔鄉曾文水庫水域設置太陽光電設施列入公共造產可行性評估生態檢核工作。</p> <p>5.曾文溪水門更新改善工程委託設計、監造技術服務之生態檢核工作。</p> <p>6.「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」生態檢核工作。</p> <p>7.「眠月線修復可行性評估委託技術服務案」計畫核定階段生態檢核。</p> <p>8.「西定河水環境改善計畫」規劃設計階段生態檢核。</p> <p>9.「鯉魚潭水庫抽泥放淤影響分析」核定階段生態檢核。</p> <p>10.「110 年度觀音湖環湖步道整建工程」規劃階段生態檢核。</p> <p>11.「鯉魚潭水庫後池、投池生態環境調查評估及環境營造」之生態檢核工作。</p> <p>12.「大甲溪輸水管第 1 標統包工程」規劃設計階段生態檢核。</p> <p>13.濁水溪萬豐村河段治理工程委託規劃設計技術服務之生態檢核。</p> <p>14.嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村管線及用戶接管工程之生態檢核。</p> <p>15.雲林溪上游段污水截流截流淨化工程之生態檢核。</p> <p>16.「台 11 線港口部落外環道可行性評估委託工作」案環境調查評析及生態檢核調查。</p>

姓名	金佐蒔
職稱	黑潮環境生態顧問有限公司/專員
負責工作	陸域生態調查及評估
學歷	國立臺灣大學森林所 碩士
專長	地理資訊系統(GIS)與應用、植物組成調查、森林生態
生態檢核實務經歷	<p>1.白河水庫集水區環境現況調查與水質改善評估規劃設計計畫。</p> <p>2.鏡面水庫集水區環境現況調查與水質改善評估規劃設計計畫。</p> <p>3.白河水庫繞庫防淤工程設計之生態檢核計畫。</p> <p>4.嘉義縣大埔鄉曾文水庫水域設置太陽光電設施列入公共造產可行性評估生態檢核工作。</p> <p>5.曾文溪水門更新改善工程委託設計、監造技術服務之生態檢核工作。</p> <p>6.「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」生態檢核工作。</p> <p>7.「眠月線修復可行性評估委託技術服務案」計畫核定階段生態檢核。</p> <p>8.「西定河水環境改善計畫」規劃設計階段生態檢核。</p> <p>9.「鯉魚潭水庫抽泥放淤影響分析」核定階段生態檢核。</p> <p>10.「110 年度觀音湖環湖步道整建工程」規劃階段生態檢核。</p> <p>11.「鯉魚潭水庫後池、投池生態環境調查評估及環境營造」之生態檢核工作。</p> <p>12.「大甲溪輸水管第 1 標統包工程」規劃設計階段生態檢核。</p> <p>13.濁水溪萬豐村河段治理工程委託規劃設計技術服務之生態檢核。</p> <p>14.嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村管線及用戶接管工程之生態檢核。</p> <p>15.雲林溪上游段污水截流截流淨化工程之生態檢核。</p> <p>16.「台 11 線港口部落外環道可行性評估委託工作」案環境調查評析及生態檢核調查。</p>

姓名	沈冠宇
職稱	黑潮環境生態顧問有限公司/專員
負責工作	陸域生態調查及評估
學歷	國立嘉義大學生物資源所 碩士
專長	地理資訊系統(GIS)與應用、植物組成調查、森林生態
生態檢核實務經歷	<p>1.「鯉魚潭水庫抽泥放淤影響分析」核定階段生態檢核。</p> <p>2.「110 年度觀音湖環湖步道整建工程」規劃階段生態檢核。</p> <p>3.「鯉魚潭水庫後池、投池生態環境調查評估及環境營造」之生態檢核工作。</p> <p>4.「大甲溪輸水管第 1 標統包工程」規劃設計階段生態檢核。</p> <p>5.濁水溪萬豐村河段治理工程委託規劃設計技術服務之生態檢核。</p> <p>6.嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村管線及用戶接管工程之生態檢核。</p> <p>7.雲林溪上游段污水截流截流淨化工程之生態檢核。</p> <p>8.「台 11 線港口部落外環道可行性評估委託工作」案環境調查評析及生態檢核調查。</p>

姓名	林欣德
職稱	黑潮環境生態顧問有限公司/專員
負責工作	陸域生態調查及評估
學歷	國立嘉義大學生物資源系 學士
專長	地理資訊系統(GIS)與應用、植物組成調查、森林生態
生態檢核實務經歷	<p>1.「鯉魚潭水庫抽泥放淤影響分析」核定階段生態檢核。</p> <p>2.「110 年度觀音湖環湖步道整建工程」規劃階段生態檢核。</p> <p>3.「鯉魚潭水庫後池、投池生態環境調查評估及環境營造」之生態檢核工作。</p> <p>4.「大甲溪輸水管第 1 標統包工程」規劃設計階段生態檢核。</p> <p>5.濁水溪萬豐村河段治理工程委託規劃設計技術服務之生態檢核。</p> <p>6.嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村管線及用戶接管工程之生態檢核。</p> <p>7.雲林溪上游段污水截流截流淨化工程之生態檢核。</p> <p>8.「台 11 線港口部落外環道可行性評估委託工作」案環境調查評析及生態檢核調查。</p>





附錄四、生態檢核表單

公共工程生態檢核自評表

計畫及工程名稱	嘉義科學園區供水北線工程-水管橋設計(含監造)及管線基本設計委託技術服務		
設計單位	黎明工程顧問股份有限公司	監造廠商	水管橋工程監造- 黎明工程顧問股份有限公司
主辦機關	台灣自來水股份有限公司南區工程處	營造廠商	基本設計階段未發包
基地位置	嘉義縣新港鄉、六腳鄉、太保市	工程預算/ 經費 (千元)	基本設計階段未發包
工程目的	自新港地區埋設Ø1000mm輸水專管及Ø1200mm水管橋兩座至嘉義科學園區供水，支援嘉義科學園區用水所需。		
工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築		
工程基本資料	工程概要	本案分為送水管線工程及水管橋工程：(1)送水管線工程，起點由縣道164號往嘉義縣新港鄉嘉民路，其中於縣道157號需穿越排水箱涵、嘉南大圳大崙分線、農田圳路箱涵、月眉大排水溝及嘉南大圳蒜頭支線，行經橋樑，再於鄉道嘉58線穿越排水箱涵後，抵達工程終點嘉義縣太保市南部科學園區嘉義園區，總埋管長度約為14.8km；(2)水管橋工程共2處，分別為跨越朴子溪之灣內大橋、跨越新埤大排之埤溝橋。輸水管線大致上沿既有道路佈設，主要規劃以明挖覆蓋工法佈設管線，遇管線複雜路口、既有構造物或橋樑時，再採取推進工法穿越為原則，以避免影響既有道路使用及通行。	
	預期效益	滿足嘉義科學園區用水需求。	
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項
工程計畫核定階段	提報核定期間： 年 月 日至 年 月 日		
	一、專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、提出生態保育原則? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	區位： <input type="checkbox"/> 法定自然保護區 <input type="checkbox"/> 一般區 (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區...等。)
		關注物種、重要棲地及高生態價值區域	是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

階段	檢核項目	評估內容	檢核事項
工程計畫核定階段	三、生態保育原則	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		採用策略	針對關注物種、重要棲地及高生態價值區域，是否採取迴避、縮小、減輕或補償策略，減少工程影響範圍？ <input type="checkbox"/> 是 _____ <input type="checkbox"/> 否
		經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？ <input type="checkbox"/> 是 _____ <input type="checkbox"/> 否
	四、民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	五、資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
規劃階段	規劃期間：113年12月17日至114年6月30日		
	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	二、基本資料蒐集調查	生態環境及議題	是否具體調查掌握自然及生態環境資料? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	三、生態保育對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	四、民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
設計階段	五、資訊公開	規劃資訊公開	是否主動將規劃內容之資訊公開? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 台灣自來水公司-生態檢核專區 https://www.water.gov.tw/ch/Subject?nodeId=5932
	設計期間：113年12月17日至114年6月30日		
	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
二、設計成果	生態保育措施及工程方案		是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

階段	檢核項目	評估內容	檢核事項
設計階段	三、民眾參與	設計說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理設計說明會，蒐集整合並溝通相關意見? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	四、資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 台灣自來水公司-生態檢核專區 https://www.water.gov.tw/ch/Subject?nodeId=5932
施工期間： 年 月 日至 年 月 日			
施工階段	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	二、生態保育措施	施工廠商	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		生態保育品質管理措施	履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查，並納入其監測計畫? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	三、民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	四、資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	一、生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	二、資訊公開	監測、評估資訊公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

民眾參與紀錄表

填表人員 (單位/職稱)	沈冠宇 (黑潮環境生態顧問有限公司/調查專員)		填表日期	民國 114 年 4 月 15 日
參與項目	<input checked="" type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 規劃設計說明會 <input type="checkbox"/> 公聽會 <input type="checkbox"/> 座談會 <input type="checkbox"/> 其他		參與日期	民國 114 年 4 月 14 日
參與人員	單位/職稱		參與角色	
黃 O 彰	黑潮環境生態顧問有限公司/專案經理		生態團隊	
沈 O 宇	黑潮環境生態顧問有限公司/專員		生態團隊	
林 O 德	黑潮環境生態顧問有限公司/專員		生態團隊	
李先生	新港鄉鄉民		在地居民	
陳先生	六腳鄉鄉民		在地居民	
生態意見摘要		處理情形回覆		
1.是否對農田環境有很大的影響？ 2.是否會對進出產生影響？		本工程供水管線大致上沿既有道路佈設，主要規劃以明挖覆蓋工法佈設管線，管線寬度僅一公尺，原則上不影響農田，若遇管線複雜路口、既有構造物或橋樑時，會採取推進工法穿越為原則，以避免影響既有農路、道路通行。		

**嘉義科學園區供水北線工程
生態保育措施自主檢查表**

檢查日期：_____ 施工進度：_____ % 預定完工日期：_____

項 次	檢查項目	執行成果				執行狀況 陳述
		已 執 行	執行 但不 足	未 執 行	非執 行期 間	
1	施工便道以既有道路為主，避免額外開闢其他自然棲地。*					
2	施工所使用的物料或材料集中堆置區，以現有裸地或空地為主，不於自然棲地另闢堆置區，降低對環境及生物之衝擊。*					
3	施工區域及施工機具行經路線加強路面灑水維護及泥沙清理，以減少揚塵產生。*					
4	明挖段施工造成之地面裸露處或土砂堆置區應覆蓋防塵網或草蓆，避免揚塵及外來植物伺機進駐。*					
5	明挖段應設立圍籬以防止動物誤闖入施工範圍而受傷，並可降低工程機具噪音的干擾，此外，圍籬應確實埋入地下 10 公分，避免於地表活動的生物透過地下掘穴的方式越過圍籬進入施工範圍。*					
6	施工區域應設置速限號誌(30 公里/小時以下)，未來車輛進出頻繁，車輛限速可以增加野生動物避車的反應時間，減少路殺。*					
7	施工整地中嚴禁使用除草劑、毒餌或殺蟲劑等化學藥劑，避免毒殺野生動物。					
8	工程施工時間避免規劃於夜間，必要之夜間照明須設置遮光罩，藉以減低工程作業對周邊夜行性生物之干擾。					
9	嚴格監督工地人員，避免有違反「野生動物保育法」之行為發生，嚴格管制施工人員不得騷擾、虐待及獵捕。					
10	整地或挖運過程中，施工機具可能產生大量噪音振動，可使用低噪音工法或低噪音機具施工，施工機具應定期維護保養，容易產生噪音的部位(如引擎)可加裝隔音裝置，施工周圍亦可搭建隔音牆或隔音布，以降低噪音振動對周邊野生動物的干擾。*					
11	施工分區分段進行，若施工期間仍發現育雛之野生動物，應局部暫停施工，並通報各縣市政府保育單位（1999）協助處理。					
12	施工單位應妥善管理工區垃圾及廚餘回收，回收容器加蓋且嚴格禁止工地人員餵養流浪動物。*					

項 次	檢查項目	執行成果				執行狀況 陳述
		已 執 行	執 行 但不 足	未 執 行	非執 行期 間	
13	若有涉及到既有路面之外的挖掘，將建議土方就地鋪平，以維持潛在之種子庫。					
14	河川行水區內之施工(例如落墩工程)，應使用既有之高灘地作為施工便道，避免擾動或阻斷水流。*					
15	施工後期應有協助棲地回復，植種選擇以適地適木之原生種為原則，不得引進任何外來物種作為植栽。*					

備註：標示*號者應檢附照片。

施工廠商

單位職稱：_____ 姓名(簽章)：_____

監造單位

單位職稱：_____ 姓名(簽章)：_____

環境生態異常狀況處理表

工程主辦機關		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日
		發現地點 (TWD97)	
工程名稱			
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)		施工廠商	
監造單位		生態檢核團隊 (施工廠商方)	
異常狀況 類型	<input type="checkbox"/> 植被剷除、 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 水質渾濁、 <input type="checkbox"/> 生態保全對象消失/損傷 <input type="checkbox"/> 其他：		
異常狀況 說明			
解決對策			

監造單位	施工廠商	
	工地主任(工地負責人)	施工廠商方生態背景人員
(簽章+日期)	(簽章+日期)	(簽章+日期)
填表人(說明 1)	計畫(/協同)主持人	
	(簽章+日期)	

異常狀況處理原則：

1. 若發現生物大量死亡，應立即停工，由現場人員拍照記錄，並通報生態相關人員
2. 若發現水質異常混濁，在排除上游降雨的情況後，應立即停工，由現場人員拍照記錄，並通報生態相關人員
3. 若發現生態保全對象遭破壞，應立即停工，由現場人員拍照記錄，並通報生態相關人員
4. 若生態保育措施執行遭遇問題或困難，應適時聯繫生態相關人員。

附錄五、現地影像記錄



